



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NASIONALE SENIORSERTIFIKAAT

GRAAD 12

LANDBOUWETENSKAPPE V1

NOVEMBER 2014

MEMORANDUM

PUNTE:150

Hierdie memorandum bestaan uit 10 bladsye.

AFDELING A**VRAAG 1**

1.1	1.1.1	C ✓✓		
	1.1.2	D ✓✓		
	1.1.3	B ✓✓		
	1.1.4	B ✓✓		
	1.1.5	D ✓✓		
	1.1.6	D ✓✓		
	1.1.7	B ✓✓		
	1.1.8	D ✓✓		
	1.1.9	C ✓✓		
	1.1.10	A ✓✓	(10 x 2)	(20)
1.2	1.2.1	Geeneen ✓✓		
	1.2.2	Slegs A ✓✓		
	1.2.3	Beide A en B ✓✓		
	1.2.4	Slegs B ✓✓		
	1.2.5	Slegs A ✓✓	(5 x 2)	(10)
1.3	1.3.1	Voervloei ✓✓		
	1.3.2	Nek-/kopklamp ✓✓		
	1.3.3	Seminale/vesikulêre klier ✓✓		
	1.3.4	Oögenese/ovigenese/saadsakkies ✓✓		
	1.3.5	Mastitis ✓✓	(5 x 2)	(10)
1.4	1.4.1	Meganies/fisies ✓		
	1.4.2	Kafeteriastyl/ad lib/vrye toegang ✓		
	1.4.3	Isolasie/afsondering/skeiding ✓		
	1.4.4	Yster/Fe/ystersulfaat ✓		
	1.4.5	Sinchronisasie ✓	(5 x 1)	(5)

TOTAAL AFDELING A: 45

AFDELING B**VRAAG 2: DIEREVOEDING****2.1 Roete van voedsel deur die maag van die herkouer**

2.1.1 **Identifikasiedie soort dier**
Herkouer/beeste/skape/bokke ✓ (1)

2.1.2 **Identifikasie van die proses geillustreer deur A, B en C**
A. Inname/ingestie/peristalse/insluk van voedsel ✓
B. Opbring/retro-peristalse ✓
C. Insluk/herinsluk/peristalse ✓ (3)

2.1.3 **Regverdiging van die voordele van proses B**

- Voedsel word fisies in kleiner/fynere dele opgebreek ✓
- Vergroot die blootstellingsoppervlakte van voedsel ✓
- Stimuleer speekselaafskeiding ✓
- Verbeter die vermenging van voedsel ✓
- Bolus vorming ✓

(Enige 3) (3)

2.2 Die gehalte van weivelde en voedingswaarde oor drie seisoene

2.2.1 **Beskrywing van die grootte van die mikro-organisme bevolking**
(a) Verhoging/styging in die amilolitiese bakteriebevolking ✓✓
(as gevolg van die hoër energiewaarde van die weiding) (2)
(b) Daling/verlaging in die proteolitiese bakteriebevolking ✓✓
(as gevolg van die lae proteïenwaarde van die weiding) (2)

2.2.2 **Gehalte van die voeraanvulling in die winter**

- Hoë kwaliteit/ryk aan proteïen/aminozuure/NPN ✓✓
- Ryk aan koolhidrate/energie ✓✓
- Aanvulling van minirale/vitamiene ✓✓

(Enige 1) (2)

2.2.3 **Vitamien wat waarskynlik onvoldoende is in die winter**
Vitamien A/retinol ✓ (1)

2.3 Koëffisiënt van verteerbaarheid van hooi

2.3.1 **Koëffisiënt van verteerbaarheid**
DM van hooi: $24\text{kg} \times \frac{12}{100} = 2,88\text{kg}$ of $24\text{kg} \times 0,88 = 21,1\text{kg}$

$$24\text{kg} - 2,88\text{kg} = 21,1\text{kg} \checkmark$$

$$= \frac{\text{Droëmateriaalinname(kg)} - \text{Droëmassa in die mis (kg)}}{\text{Droëmateriaalinname(kg)}} \times \frac{100}{1} \checkmark$$

$$= \frac{21,1\text{kg} - 7,3\text{kg}}{21,1\text{kg}} \times \frac{100}{1} \checkmark$$

$$= 65,4\% \checkmark (5)$$

2.3.2 Regverdig waarom hooi nie aanbeveel word nie

- Verteerbaarheid is 65,4% ✓
- daarom is aanvulling nodig ✓

(2)

2.4 Samestelling van voere**2.4.1 Voer vir nie-herkouers aanbeveel**

Voer A ✓

(1)

2.4.2 Motivering vir Voer A

- Bevat 'n lae persentasie ruvese/6%l ✓
- Hoë % TVV/80% ✓
- Hoë % VP/8% ✓
- Daarom is dit makliker verteerbaar ✓

(Enige 2) (2)

2.4.3 Berekening van die voedingsverhouding (VV) Voer B

$$VV = 1: \frac{TVV - VP}{VP} \checkmark$$

$$= 1: \frac{50\% - 4\%}{4\%} \checkmark$$

Of

$$= 1: \frac{46\%}{4\%} \checkmark$$

$$= 1: 11.5/1:12 \checkmark$$

(3)

2.5 Voervloeiprogram**2.5.1 Maande met oorskot/te veel voer**

2/twee maande ✓

(1)

2.5.2 Maand met voertekorte

September/Sep. ✓

(1)

2.5.3 Bereken die voertekort tydens die maand van Oktober

$$120 \text{ ton} - 80 \text{ ton} = 40 \text{ ton} \checkmark$$

$$40 \text{ ton} \times 1000 \checkmark \text{ of } \frac{40 \text{ ton} \times 1000 \text{ kg}}{1 \text{ ton}} \checkmark$$

$$= 40 000 \text{ kg} \checkmark$$

(3)

2.5.4 DRIE kostedoeltreffende maatreëls gedurende Jan en Feb

- Deur die voer te sny ✓
- Baal/die maak van hooi/kuilvoer ✓
- Stoor ✓

(3)

[35]

VRAAG 3: DIEREPRODUKSIE, BESKERMING EN BEHEER**3.1 Boerderystelsels**

- 3.1.1 **Identifiseer die produksiestelsel**
Agterplaas/skrophoenders/bestaans/free-range ✓ (1)
- 3.1.2 **DRIE voordele van die agterplaassisteem vir landelike gemeenskappe**
 - Goedkoper ✓
 - Maklik om te bestuur ✓
 - Geen gespesialiseerde toerusting word benodig nie ✓
 - Geen gespesialiseerde kennis/kundigheid is nodig ✓
 - Meer omgewings vriendelik ✓
(Enige 3) (3)
- 3.1.3 **Drie probleme met agterplaassisteem**
 - Siektes versprei maklik ✓
 - Swak voedingstoestande/kombuisafval is minder voedsaam✓
 - Hoë risiko weens predatore ✓
 - Diefstal ✓
 - Energie/nutriënte word gebruik vir nie-produksie doeleindes/ lae produksie uitsette ✓
 - Blootgestel aan ekstreme omgewings kondisies ✓
(Enige 3) (3)

3.2 Strukture, apparate en toebehore wat gebruik word vir die hantering van diere in 'n diereproduksie stelsel

- 3.2.1 Doringdraadheining om landbougrond te verdeel ✓ (1)
- 3.2.2 Kraal van takke en stokke ✓ (1)
- 3.2.3 'n Skuiling van houtpale en seil ✓ (1)
- 3.2.4 Rooivlae en waarskuwingstekens ✓ (1)

3.3 Produksiestelsels

- 3.3.1 **Produksiestelsel deur BOER A**
Ekstensiewe stelsel ✓ (1)
- 3.3.2 **TWEE redes**
 - Minder werkers/2 werkers ✓
 - Beperkte fasilitete/1 hanterings fasilitet/1 plaasstoer/8 windpompe/1 dipstasie ✓
 - Minder diere op 'n groot oppervlakte/400 beese op 4800Ha ✓
 - Maak gebruik van natuurlike weiding ✓
(Enige 2) (2)
- 3.3.3 **Verskille in voedingstrategieë.**
 - BOER A. Diere loop op natuurlike weidings/ekstensief ✓
 - BOER B. Diere is in 'n voerkraal/intensief ✓
(2)

3.3.4	TWEE maatreëls om BOER A se produksie te verhoog	
	<ul style="list-style-type: none"> • Aanvulling/aanvullende voere/voeding ✓ • Beheer uiterste omgewingstoestande d.m.v. skuilings ✓ • Goeie gesondheidsbeheerstelsels/program ✓ • Regte teelmetodes/beleid ✓ • Effektiewe weidingstelsel/wisselweiding stelsel ✓ 	(Enige 2) (2)
3.4	Die gesondheid van 'n dier	
3.4.1	Deel van die liggaam waarin die termometer geplaas word	
	Rektum/anus ✓	(1)
3.4.2	Gesondheidsaanduiders vir akute toestande	
	(a) Hoër liggaamstemperatuur ✓	(1)
	(b) Hoër/vinniger asemhalingstempo ✓	(1)
	(c) Hoër/vinniger polstempo/hartklop ✓	(1)
3.5	Bosluisse en beheer	
3.5.1	Tipe en naam van die bosluis	
	<ul style="list-style-type: none"> • Eengasheerbosluis ✓ • Bloubosluis ✓ 	(2)
3.5.2	Siektes oordra	
	<ul style="list-style-type: none"> • Rooiwatter ✓ • Anaplasmose/galsiekte ✓ 	(Enige 1) (1)
3.5.3	Regverdiging van chemiese stof as ekologies vriendelik	
	<ul style="list-style-type: none"> • Residuele aksie ✓ • Nie-sistemiese aksie ✓ • Renostervoël vriendelik ✓ 	(Enige 2) (2)
3.5.4	Metode van toedienning	
	Opgiet ✓	(1)
3.5.5	Bewyse van die rol van die staat in die beheer van gesondheidsmiddels en medisyne	
	<ul style="list-style-type: none"> • Registrasie nommer/Reg. No. G2837 Wet 36/1947 ✓ • Aktiewe bestanddele en hoeveelhede/Deltrametrin 0.50% m/v, Amitraz 2,0% m/v, Piperonyl Butoxide 2,0% m/v ✓ 	(2)

3.6 Plantvergiftiging

3.6.1 TWEE plante wat giftig is

- Gifblaar ✓
- Stinkblaar/gifappel ✓
- Datura spesies ✓
- *Lantana camara* ✓
- Slangkop ✓
- Tulpe ✓
- Seneciosis ✓
- Gousiekte ✓
- Diplodiosis ✓
- Geeldikkop ✓
- Vermeersiekte ✓
- Vuursiektebossie ✓
- Lupins ✓
- Blou-groen alge ✓
- Buffelsgras ✓
- Duiwelsdoring ✓

(Enige 2) (2)

3.6.2 DRIE voorkomingsmaatreëls vir die beheer van gifplante

- Verwyder gifplante uit weidings/brand geaffekteerde dele/behandel met onkruiddoders/chemiese middels ✓
- Verwyder diere uit kampe wat met gifplante besmet is ✓
- Verskaf genoeg voer/water aan diere/voldoende voedingswaarde/moenie diere laat honger lei nie ✓
- Vermy oorbeweiding ✓
- Pas 'n wisselweidingstelsel toe ✓
- Ondersoek hooi wat in stalle gehou word ✓
- Kennis van gifplante ✓
- Moenie gemufte hooi/in dele gesny waar gifplante voorkom aan diere voer nie ✓

(Enige 3) (3)
[35]

VRAAG 4: DIEREREPRODUKSIE

4.1 Vroulike reproduksieorgane

4.1.1 Identifikasie van die dele van die vroulike dier

- A - Baarmoederhoring ✓
- B - Fallopiesebus ✓
- C - Ovarium ✓
- F - Vagina ✓

(4)


4.1.2 Letter en naam van die gedeelte met 'n slymprop

- G✓
- Serviks ✓

(2)

4.2 Hormoonvlakke gedurende bronstigheid

4.2.1 Grafiek van die hormoonvlakke



Kriteria/rubriek/merkglyne:

- Korrekte opskrif ✓
 - Y-as – Korrekte indelings/skaal en byskrifte (Konsentrasie) ✓
 - X-as – Korrekte indelings/skaal en byskrifte (Dae) ✓
 - Korrekte eenhede ✓
 - Akkuraatheid ✓
 - Lyngrafiek ✓
- (6)

4.2.2 Rol van progesteron

Inhibeer die afskeiding/funksionering van estrogeen ✓

(1)

4.2.3 Tyd van volle ontwikkeling van die follikel

Dag 20 ✓

(1)

4.2.4 Motivering/rede

Estrogeen is op sy hoogste vlakke/30mg/ml ✓

of

Progesteron is op sy laagste vlak/3mg/ml ✓

(1)

4.3 Skematische voorstelling van 'n spermsel

4.3.1 Identifikasie van deel B

Nukleus/kern ✓

(1)

4.3.2 Gemerkte gedeelte wat die akrosoom verteenwoordig

A ✓

(1)

- 4.3.3 **Funksie van gemerkte gedeelteE**
Maak beweging van die spermsel moontlik ✓ (1)
- 4.3.4 **Onderskei tussen 'n spermsel en semen.**
 - **Sperm sel** - Die manlike gamete/geslagsel/reproduksieselle ✓
 - **Semen** - Mengsel van spermselle en afskeidings van die aanvullendegeslagskliere ✓ (2)
- 4.3.5 **TWEE metodes van semen versameling**
 - Kunsvagina ✓
 - Elektriese stimulator/elektro-ejakulator ✓ (2)
- 4.4 **Kunsmatige inseminasie by plaasdiere**
- 4.4.1 **Omskryf KI**
 - Tegniek waar die semen kunsmatig van bulle getap word en ✓
 - kunsmatig in die geslagskanaal van koeie geplaas word ✓ (2)
- 4.4.2 **DRIE vereistes vir KI**
 - Korrekte bronstigheds/hitte waarneming ✓
 - Korrekte/goeie tydsberekening ✓
 - Gebruik lewenskragtige semen ✓
 - Korrekte tegniek ✓
 - Gebruik slegs kundige/ervare insemineerders ✓
 - Handhaaf hoë higiëniese standaarde ✓ (Enige 3) (3)
- 4.5 **Stadia van embryo-oorplasing**
- 4.5.1 **Identifiseer die tegniek**
Embrio oorplasing ✓ (1)
- 4.5.2 **Korrekte volgorde van die embryo-oorplantingsproses**
 - E/Sinchroniseer beide die skenker- en die ontvangerkoeie ✓
 - C/Superovuleer die skenkerkoei ✓
 - B/KI die skenkerkoei ✓
 - A/Spoel die embryo's uit die skenkerkoei ✓
 - D/Plaas die embryo's na die ontvangerkoeie oor ✓ (5)

4.5.3

TWEE voordele van embryo-oorplasings

- Meer nageslag word geproduseer van goeie koeie ✓
- Genereer winste vanuit die verkope van goeie genetika ✓
- Koste-effektiewe metode om die genetika van bestaande kuddes te verbeter ✓
- Kan die produktiewe lewe van ou maar goeie koeie verleng ✓
- Hou die genetika van die kudde instand ✓
- Diere word geteel om siekteweerstand/melk/vleis produksie te verbeter ✓

(Enige 2)

(2)
[35]

TOTAAL AFDELING B: 105
GROOTTOTAAL: 150