



Mev Angie Motshekga,
Minister van Basiese
Onderwys



Mnr Enver Surty,
Adjunkminister van Basiese
Onderwys

Hierdie werkboeke is vir Suid-Afrika se kinders ontwikkel onder leiding van die Minister van Basiese Onderwys, mev Angie Motshekga, en die Adjunkminister van Basiese Onderwys, mnr Enver Surty.

Die Reënboog-werkboeke maak deel uit van 'n reeks intervensies deur die Departement van Basiese Onderwys met die doel om die prestasie van Suid-Afrikaanse leerders in die eerste ses grade te verbeter. Hierdie projek is 'n prioriteit van die Regering se Plan-van-Aksie en moontlik gemaak deur die ruim befondsing van die Nasionale Tesourie. Die Departement is hierdeur in staat gestel om hierdie werkboeke gratis in al die amptelike tale te voorsien.

Ons hoop dat u as onderwyser hierdie werkboeke in u daaglikse onderrig nuttig sal vind en ook sal verseker dat u leerders die kurrikulum dek.

Al die aktiwiteite in die werkboeke het ikone om aan te dui wat die leerders moet doen.

Ons hoop van harte dat die leerders dit gaan geniet om deur die boeke te werk terwyl hulle leer en groei en dat u as onderwyser dit saam met hulle sal geniet.

Ons wens u en u leerders alle sukses in die gebruik van hierdie werkboeke toe.

ISBN: 978-1-4315-0227-1



**MATHEMATICS IN AFRIKAANS
GRADE 9 – BOOK 1
TERMS 1 & 2**

ISBN 978-1-4315-0227-1

**THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.**



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
Fifth edition 2015

Author team: Blom, L., Lotter, D., Aitchison J.J.W.

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked, the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.



WISKUNDE IN AFRIKAANS – Graad 9 Boek 1

ISBN 978-1-4315-0227-1

Hersien volgens
die KABV



Graad **9**

Naam:

Klas:



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

WISKUNDE IN AFRIKAANS

Boek 1
Kwartaal
1 & 2

No.	Titel	Bl.	No.	Titel	Bl.
R1	Natuurlike getalle en eienskappe van getalle	ii	27	Rye	68
R2a	Veelvoude en faktore	iv	28	Meetkundige en numeriese patrone	70
R2b	Veelvoude en faktore (vervolg)	vi	29	Optelling en aftrekking van gelyksoortige terme	72
R3a	Eksponente	viii	30a	Die produk van 'n monoom en binoom of trinoom	74
R3b	Eksponente (vervolg)	x	30b	Die produk van 'n monoom en binoom of trinoom (vervolg)	76
R4	Heelgetalle en patrone	xii	31a	Die produk van twee binome	78
R5	Gewone breuke	xiv	31b	Die produk van twee binome (vervolg)	80
R6a	Persentasies en desimale breuke	xvi	32	Meer oor die produk van twee binome	82
R6b	Persentasies en desimale breuke (vervolg)	xviii	33	Deel monome en binome	84
R7a	Inset en uitset	xx	34	Substitusie	86
R7b	Inset en uitset (vervolg)	xxii	35a	Faktoriseer algebraïese uitdrukkings	88
R8a	Algebra	xxiv	35b	Faktoriseer algebraïese uitdrukkings (vervolg)	90
R8b	Algebra (vervolg)	xxvi	36	Deel 'n trinoom en polinoom deur 'n monoom	92
R9	Grafieke	xviii	37a	Lineêre vergelykings wat breuke bevat	94
R10a	Finansiële wiskunde	xxx	37b	Lineêre vergelykings wat breuke bevat (vervolg)	96
R10b	Finansiële wiskunde (vervolg)	xxxii	38	Los vergelykings op in die vorm: 'n produk van faktore is gelyk aan nul	98
R11a	Meetkundige figure	xxxiv	39	Konstrueer hoeke en poligone deur 'n gradeboog te gebruik	100
R11b	Meetkundige figure (vervolg)	xxxvi	40a	Gebruik 'n passer	102
R12	Transformasies	xxxviii	40b	Gebruik 'n passer (vervolg)	104
R13	Meetkundige objekte	xl	41a	Konstruksie van driehoeke	106
R14	Omtrek en oppervlakte	xlii	41b	Konstruksie van driehoeke (vervolg)	108
R15a	Volume en buite-oppervlakte	xliv	42a	Konstruering van vierhoeke (tetragone)	110
R15b	Volume en buite-oppervlakte (vervolg)	xlvi	42b	Konstruering van vierhoeke (vervolg)	112
R16a	Data	xlviii	43	Reëlmatige en onreëlmatige poligone	114
R16b	Data (vervolg)	l	44	Konstrueer 'n seshoek	116
1a	Reële getalle, rasionale getalle en irrasionale getalle	2	45	Konstruksie van 'n vyfhoek	118
1b	Reële getalle, rasionale getalle en irrasionale getalle (vervolg)	4	46	Konstruksie van 'n agthoek	120
2	Faktoriserings	6	47	Binnehoeke van 'n driehoek	122
3	Verhouding, eweredigheid en spoed	8	48a	Driehoeke	124
4	Wat is direkte eweredigheid?	10	48b	Driehoeke (vervolg)	126
5	Omgekeerde eweredigheid	12	49	Poligone	128
6	Finansies – Begroting, lenings en rente	14	50a	Nog poligone	130
7	Finansies – Huurkoop	16	50b	Nog poligone (vervolg)	132
8	Finansies – Wisselkoerse	18	51a	Gelyksoortige driehoeke	134
9	Finansies – Kommissie en huurgeld	20	51b	Gelyksoortige driehoeke (vervolg)	136
10a	Eienskappe van getalle	22	52a	Kongruente driehoeke	138
10b	Eienskappe van getalle (vervolg)	24	52b	Kongruente driehoeke (vervolg)	140
11	Optelling en aftrekking van breuke	26	53	Lyne en hoeke	142
12	Optelling en aftrekking van breuke wat vierkante, kubusse, vierkantswortels en derdemagswortels insluit	28	54	Komplementêre en supplementêre hoeke	144
13a	Vermenigvuldiging van gewone breuke	30	55a	Snylyne	146
13b	Vermenigvuldiging van gewone breuke (vervolg)	32	55b	Snylyne (vervolg)	148
14	Deling van breuke	34	56	Pare hoeke	150
15a	Persentasies	36	57a	Toepassing van meetkundige figure en lyne	152
15b	Persentasies (vervolg)	38	57b	Toepassing van meetkundige figure en lyne (vervolg)	154
16	Gewone breuke, desimale breuke en persentasies	40	58a	Pythagoras se stelling	156
17	Optelling, aftrekking en afronding van desimale breuke	42	58b	Pythagoras se stelling (vervolg)	158
18	Veelvoudige bewerkinge met desimale	44	59a	Meer omtrent die stelling van Pythagoras	160
19a	Bereken vierkante, vierkantswortels, kubusse en derdemagswortels	46	59b	Meer omtrent die stelling van Pythagoras (vervolg)	162
19b	Bereken vierkante, vierkantswortels, kubusse en derdemagswortels (vervolg)	48	60	Omtrek van 'n vierkant en reghoek; oppervlakte van 'n vierkant en reghoek	164
20a	Bereken nog vierkante, vierkantswortels, kubusse en derdemagswortels	50	61	Oppervlakte van 'n driehoek	166
20b	Bereken nog vierkante, vierkantswortels, kubusse en derdemagswortels (vervolg)	52	62	Oppervlakte van parallelogramme en trapesiums	168
21	Eksponentvorm	54	63	Oppervlakte van 'n rombus en 'n vlieër	170
22	Eksponentwette: $a^m \times a^n = a^{m+n}$	56	64	Oppervlakte van 'n sirkel	172
23	Eksponentwette: $a^m \div a^n = a^{m-n}$	58			
24	Eksponentwette: $a^m \div a^n = a^{m-n}$ as $m < n$	60			
25	Eksponentwette: $a^0 = 1$ en $(a \times t)^n = a^n \times t^n$	62			
26a	Toepassing van die eksponentwette	64			
26b	Toepassing van die eksponentwette (vervolg)	66			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120
7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140
8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152	160
9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171	180
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220
12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240
13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260
14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280
15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300
16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240	256	272	288	304	320
17	34	51	68	85	102	119	136	153	170	187	204	221	238	255	272	289	306	323	340
18	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234	252	270	288	306	324	342	360
19	38	57	76	95	114	133	152	171	190	209	228	247	266	285	304	323	342	361	380
20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400



Graad **9**

Wiskunde

- 1** Hersiening Werkblaaie: R1 tot R16
Sleutelkonsepte van Graad 8
- 2** Werkblaaie: 1 tot 64
- 3** Werkblaaie: 65 tot 144

Naam:

AFRIKAANS
Boek
1

Die struktuur van 'n werkblad

Werkblad nommer
(Hersiening R1 tot R16,
Gewone 1 tot 148)

Werkblad titel

Tema inleiding

(Teks en prentjies om jou te help om te dink oor en om die tema van die werkblad te bespreek.)

Kwartaal aanwyser
(Daar is veertig werkblaaie per kwartaal.)

Vrae

Kleur kode vir inhoud area

Inhoud	Kantlyn kleur
Hersiening	Pers
Nommer	Turkoois
Patrone en funksies (algebra)	Elektriese blou
Spasie en vorms (meetkunde)	Oranje
Meting	Groen
Data hantering	Rooi

31 Opvul van tiene

Watter som is makliker om op te tel? Hoekom?

8 + 7 = of 10 + 5 =
 10 + 4 = of 7 + 7 =
 9 + 2 = of 10 + 1 =
 10 + 2 = of 7 + 5 =

In een minuut, hoeveel kombinasies kan jy vind wat tot by 50 sal optel?

1. Vul die tiene op.

Voorbeeld:

3 + 7 = 10	8 + 2 = 10
2 + 8 = 10	9 + 1 = 10
5 + 5 = 10	4 + 6 = 10
1 + 9 = 10	7 + 3 = 10
6 + 4 = 10	0 + 10 = 10

Is daar meer kombinasies wat tot by tien sal optel?

a. 3 + = b. 5 + = c. 2 + =
 d. 6 + = e. 1 + = f. 7 + =
 g. 8 + = h. 9 + = i. 4 + =

2. Vul die tiene op.

Voorbeeld:

37 + 3 = 40	25 + 5 = 30
14 + 6 = 20	68 + 2 = 70
79 + 1 = 80	43 + 7 = 50
56 + 4 = 60	84 + 6 = 90
92 + 8 = 100	36 + 4 = 40

Gee nog vyf kombinasies wat tot by honderd sal optel.

a. 32 + = b. 46 + = c. 54 + =
 d. 72 + = e. 78 + = f. 68 + =
 g. 15 + = h. 94 + = i. 83 + =

Taal kleur kode:
Afrikaans (Rooi), Engels (Blou)

3. Vul die honderde op.

Voorbeeld: 486

486 + 14 = 500

a. 368 b. 371 c. 684
 d. 519 e. 225 f. 568
 g. 274 h. 479 i. 383

4. Bereken die volgende.

Voorbeeld:

Bereken $2\ 486 + 48$

$2\ 486 + 48$
 $= (2\ 486 + 14) - 14 + 48$
 $= 2\ 500 + (48 - 14)$
 $= 2\ 500 + 34$
 $= 2\ 534$

a. $3\ 526 + 97 =$ b. $6\ 537 + 84 =$ c. $4\ 833 + 95 =$
 d. $1\ 789 + 39 =$ e. $2\ 786 + 56 =$ f. $8\ 976 + 41 =$
 g. $4\ 324 + 98 =$ h. $8\ 159 + 62 =$ i. $6\ 847 + 73 =$

Die konsert

7 894 mense het na die konsert kom kyk. Daar was 68 sekuriteits-wagte. Hoeveel mense was daar by die konsert gewees?

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Voorbeeld raam (in geel)

Pret / uitdaging / probleem oplos aktiwiteit
(Dit is die einde van 'n werkblad aktiwiteit wat prettige of uitdagende aktiwiteite kan insluit wat ook met ouers of broers en susters by die huis gedeel kan word.)

Onderwyser assessering beoordeling, handtekening en datum



Graad **9**

Wiskunde

DEEL

1

Hersiening

Sleutelkonsepte van Graad 8

WERKBLAAIE R1 tot R16

Naam:

AFRIKAANS

Boek

1

Natuurlike getalle en eienskappe van getalle

Wat beteken “rekenkunde”? Hoekom is dit belangrik?

Rekenkunde is die oudste en mees elementêre vertakking van wiskunde wat handel oor die eienskappe en hantering van getalle. Amper almal gebruik dit in alledaagse take, van gewone optelling en berekenings tot ingewikkelde wetenskaps- en besigheidsberekenings. Dit is die bestudering van hoeveelheid, veral as gevolg van getalle wat saamgevoeg word. In basiese rekenkunde word die vier bewerkings van optelling, aftrekking, vermenigvuldiging en deling met heelgetalle, rasionale en reële getalle, met inbegrip van meting en meetkunde, gebruik.

Aktiwiteit 1 tot 16 is nie net hersieningsoefeninge nie maar is ook 'n samevatting van belangrike begrippe wat jy in graad 9 gaan nodig kry.



1. Bereken die volgende antwoorde en rond jou antwoorde af tot die naaste tiende, honderdste en duisendste.

a.
$$\begin{array}{r} 78\,438 \\ + 19\,469 \\ \hline \end{array}$$

b.
$$\begin{array}{r} 83\,408 \\ - 46\,753 \\ \hline \end{array}$$

c.
$$\begin{array}{r} 37\,489 \\ \times 128 \\ \hline \end{array}$$

d.
$$39 \overline{)87\,652}$$

2. Gebruik 'n sakrekenaar om jou antwoorde te kontroleer.
3. Teken 'n vloeiagram en gebruik die terme “natuurlike getalle”, “telgetalle” en “heelgetalle” daarin.

4. Voltooi die volgende:

a. Die **kommutatiewe** eienskap van optelling en vermenigvuldiging:

i. $a + b =$

ii. $a \times b =$

b. Die **assosiatiewe** eienskap van optelling en vermenigvuldiging:

i. $(a + b) + c =$

ii. $(a \times b) \times c =$

c. Die distributiewe eienskap van vermenigvuldiging bo optelling en aftrekking:

i. $a(b + c) =$

ii. $a(b - c) =$

d. 0 (nul) as die **identiteits**element van optelling: =

e. 1 (een) as die identiteitslement van vermenigvuldiging:

=

5. Bereken die volgende deur die eienskappe van natuurlike getalle te illustreer:

Voorbeeld: $44 + 55 = 55 + 44 = 99$

a. $51 + (19 + 46) =$

b. $4(12 + 9) =$

c. $(9 \times 64) + (9 \times 36) =$

d. $33 + 199 = 232$, en $232 =$

e. $20 \times 5 = 100$, en $100 =$

Probleemoplossing

Ontwikkel 'n problemsom deur al vier basiese bewerkings te gebruik. Dit moet 'n alledaagse voorbeeld wees.



Teken:

Datum:

Veelvoude

Die produk wat jy kry as jy 'n getal met 'n heelgetal vermenigvuldig, bv. $3 \times 4 = 12$. Die veelvoude van 3 is: 3, 6, 9, ...

Faktore

Faktore is die getalle wat jy saam kan vermenigvuldig om 'n spesifieke resultaat te kry, bv. 3 en 4 is faktore van 12. Al die faktore van 12 is 1, 2, 3, 4, 6, 12

Priemfaktor van 'n natuurlike getal is 'n deler van die getal wat ook 'n priemgetal is.

KGV

Kleinste gemene veelvoud

Praat oor ...

GGF

Grootste gemeenskaplike faktor

1. Identifiseer die KGV:

Voorbeeld: Veelvoude van 3: {3, 6, 9, 12, 15, 18, ...}
 Veelvoude van 4: {4, 8, 12, 16, 20, ...}
 KGV = 12

a. Veelvoude van:

7: {_____}

6: {_____}

KGV: 8

b. Veelvoude van:

8: {_____}

2: {_____}

KGV: _____

c. Veelvoude van:

5: {_____}

4: {_____}

KGV: _____

d. Veelvoude van:

9: {_____}

6: {_____}

KGV: _____

2. Bereken die GGF deur faktorisering of inspeksie te gebruik.

Voorbeeld: Faktore van 192 en 216

192	2	216	2
96	2	108	2
48	2	54	2
24	2	27	3
12	2	9	3
6	2	3	3
3	3	1	
1			



$$192 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$$

$$216 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3$$

Gemeenskaplike faktore is = 2, 2, 2, 3

$$\text{GGF} = 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 24$$

Faktorboom van 192



Ek weet dat 192 deelbaar is deur 3 omdat $1 + 9 + 2 = 12$, en 12 is deelbaar deur 3 sonder 'n res.

'n Faktorboom word gebruik om 'n getal in sy priemfaktore op te breek.

a. Faktore en GGF van 204 en 252

204	2	252	2
102	2	106	2
51	3	63	3
17	17	21	3
1		7	7
		1	

$$204 = 2 \times 2 \times 3 \times 17$$

$$252 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 7$$

$$\text{GGF} = 2 \times 2 \times 3 = 12$$

b. Faktore en GGF van 208 en 234

c. Faktore en GGF van 72 en 188

d. Faktore en GGF van 275 en 350

vervolg



Teken:

Datum:

v

e. Faktore en GGF van 456 en 572

f. Faktore en GGF van 205 en 315

3. Bereken die KGV deur faktorisering of inspeksie te gebruik:

Voorbeeld: Faktore van 123 en 141

$$\begin{array}{r|l} 123 & 3 \\ 41 & 41 \\ 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 141 & 3 \\ 47 & 47 \\ 1 & \end{array}$$

$$123 = 3 \times 41$$

$$141 = 3 \times 47$$

$$\text{KGV} = 3 \times 41 \times 47 = 5\,781$$

a. Faktore en KGV van 243 en 729

b. Faktore en KGV van 200 en 1 000

c. Faktoreen KGV van 225 en 675

d. Faktoreen KGV van 128 en 256

e. Faktoreen KGV van 162 en 486

f. Faktoreen KGV van 225 en 675

Probleemoplossing

Verduidelik aan 'n familielid hoe die GGF met behulp van faktorisering bereken word.



Teken:

Datum:

Hersien die eksponentwette deur die volgende te voltooi:

$x^m x^n =$

$x^1 =$

$x^m \div x^n =$

$(x^m)^n =$

$x^0 =$

$\text{en } x \neq 0$

Hoekom moet jy die eksponentwette bestudeer?



1. Skryf hierdie getalle in eksponentvorm.

Voorbeeld: 144

$= 12 \times 12$

$= 12^2$

a. 64

b. 9

2. Skryf hierdie getalle in eksponentvorm.

Voorbeeld: 81

$= 3 \times 3 \times 3 \times 3$

$= 3^4$

a. 27

b. 8

3. Skryf die volgende in eksponentvorm.

Voorbeeld: $64 + 8$

$= 8^2 + 2^3$

a. $125 + 25 =$

b. $64 + 125 =$

4. Skryf die volgende in eksponentvorm.

Voorbeeld: $50 \times 50 \times 50 \times 50 \times 50 \times 50 \times 50 = 50^7$

a. $30 \times 30 \times 30 \times 30 \times 30 =$

b. $40 \times 40 \times 40 \times 40 \times 40 \times 40 \times 40 \times 40 \times 40 \times 40 =$

5. Beskou die voorbeelde en bereken:

Voorbeeld: $3^1 = 3$, $25^1 = 25$, $m^1 = m$, $9^1 = 9$

a. $x^1 =$

b. $a^1 =$

6. Antwoord positief of negatief sonder om die berekening te doen:

Voorbeeld: $(-15)^2$ is positief

$(15)^2$ is positief

$(-15)^3$ is negatief

a. $(-9)^2$

b. $(18)^2$

7. Vereenvoudig:

Voorbeeld: $a \times b \times a \times b$
 $= a^2 \times b^2$

$b^2 \times c^2 \times c^2 \times b^2$
 $= b^4 \times c^4$

a. $g \times g \times h \times h \times h =$ b. $a \times a \times b \times b \times a \times a =$

8. Hersiening: bereken die vierkantswortel:

Voorbeeld: $\sqrt{9}$
 $= \sqrt{3 \times 3}$
 $= 3$

a. $\sqrt{64} =$

b. $\sqrt{25} =$

9. Bereken die vierkantswortel aan die hand van die voorbeeld.

Voorbeeld: $\sqrt{256}$
 $= \sqrt{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \times 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}$
 $= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$
 $= 16$

<u>256</u>	<u>2</u>
<u>128</u>	<u>2</u>
<u>64</u>	<u>2</u>
<u>32</u>	<u>2</u>
<u>16</u>	<u>2</u>
<u>8</u>	<u>2</u>
<u>4</u>	<u>2</u>
<u>2</u>	<u>2</u>
1	



Onthou dat dit priemfaktoriserings genoem word.

Hoe weet ek om deur 2 te begin deel?



Jy moet altyd probeer om met die kleinste priemgetal te begin.



Maar hoe weet ek die getal kan deur 2 of 3 of 5, ens., gedeel word?



Jy pas die reëls vir deelbaarheid toe.

Toets jou antwoord: $16 \times 16 = 256$

a. $\sqrt{324} =$

b. $\sqrt{1296} =$



Teken:

Datum:

vervolg

10. Hersien: bereken:

Voorbeeld: $\sqrt{12 \cdot 12}$
 $= 12$

a. $\sqrt{2 \cdot 2} =$

b. $\sqrt{3 \cdot 3} =$

11. Stel die vierkantswortel in sy eenvoudigste vorm voor:

Voorbeeld: $\sqrt{2 \cdot 2 \cdot 2}$
 $= 2\sqrt{2}$

a. $\sqrt{3 \cdot 3 \cdot 3} =$

b. $\sqrt{6 \cdot 6 \cdot 6} =$

12. Stel die vierkantswortel in sy eenvoudigste vorm voor:

Voorbeeld: $\sqrt{8}$
 $= \sqrt{2 \times 2 \times 2}$
 $= 2\sqrt{2}$

a. $\sqrt{12} =$

b. $\sqrt{45} =$

13. Beskou die voorbeeld en voltooi die volgende:

Voorbeeld: $3^2 = 9$ dus $\sqrt{9} = 3$

a. $5^2 =$

b. $9^2 =$

14. Vereenvoudig en toets jou antwoord.

Voorbeeld: $2^3 \times 2^2$
 $= 2^{3+2}$
 $= 2^5$
 $= 32$

Toets: $2^3 \times 2^2$
 $= 8 \times 4$
 $= 32$

$8^5 \times 8^9 =$

15. Bereken en toets jou antwoord.

Voorbeeld: $x^3 \times x^4$
 $= x^{3+4}$
 $= x^7$

Toets jou antwoord: $x = 2$
 $2^3 \times 2^4$
 $= 8 \times 16$
 $= 128$

2^{3+4}
 $= 2^7$
 $= 128$

$p^7 \times p^3 =$

16. Los op.

Voorbeeld: $3^5 \div 3^2$
 $= 3^{5-2}$
 $= 3^3$
 $= 27$

Toets: $3^5 \div 3^2$
 $= 243 \div 9$
 $= 27$

$1^{10} \div 1^{10} =$

17. Vereenvoudig en toets jou antwoord:

Voorbeeld:

$$\begin{aligned} x^5 \div x^3 \\ = x^{5-3} \\ = x^2 \end{aligned}$$

Toets jou antwoord: $x = 2$

$$\begin{aligned} 2^5 \div 2^3 &= 2^{5-3} = 2^2 = 4 \\ 2^5 \div 2^3 &= 32 \div 8 = 4 \end{aligned}$$

$$g^{20} \div g^{15} =$$

Toets as $g = 3$

Jy mag jou sakrekenaar gebruik.

18. Vereenvoudig en toets jou antwoord:

Voorbeeld:

$$\begin{aligned} (2^3)^2 \\ = 2^{3 \times 2} \\ = 2^6 \\ = 64 \end{aligned}$$

Toets: $(2^3)^2$

$$\begin{aligned} &= (8)^2 \\ &= 64 \end{aligned}$$

$$(7^9)^4 =$$

19. Vereenvoudig en toets jou antwoord:

Voorbeeld:

$$\begin{aligned} (x^3)^2 \\ = x^{3 \times 2} \\ = x^6 \end{aligned}$$

Toets jou antwoord: $x = 3$

$$\begin{aligned} (3^3)^2 &= (3^3)(3^3) \\ &= (3)^{3 \times 2} = 3^6 = 729 \\ &= 27 \times 27 = 729 \end{aligned}$$

$$(p^2)^6 =$$

Toets as $p = 2$

20. Vereenvoudig: $(23s^{10})^2 =$

Voorbeeld:

$$\begin{aligned} (3x^2)^3 \\ = 3 \cdot x^{2 \times 3} \\ = 27x^6 \end{aligned}$$

21. Vereenvoudig:

Voorbeeld:

$$\begin{aligned} (a \times t)^n \\ = a^n \times t^n \end{aligned}$$

$$(b \times c)^y =$$

22. Los met behulp van albei metodes.

Voorbeeld:

$$\begin{aligned} a^4 \div a^4 \\ = \frac{a \cdot a \cdot a \cdot a}{a \cdot a \cdot a \cdot a} \\ = 1 \\ \text{As } a \neq 0 \end{aligned}$$

a^4 beteken
 $a \times a \times a \times a$
wat dieselfde
beteken as
 $a \cdot a \cdot a \cdot a$

$$\begin{aligned} &= a^{4-4} \\ &= a^0 \\ \text{As } a \neq 0 \end{aligned}$$

$$m^3 \div m^3 =$$

Hoekom is eksponent nul = 1? Neem die voorbeeld van 3^0 . Enige getal gedeel deur homself is 1. Ons weet dat $3^2 \div 3^2 = 1$, maar $3^2 \div 3^2 = 3^{2-2} = 3^0$. Dus $3^0 = 1$.

Probleemoplossing

Tel die eerste 10 vierkantsgetalle op.

Stel die vierkantswortel van enige viersyfergetal voor deur priemfaktoriserings te gebruik.

Teken:

Datum:

Heelgetalle
(natuurlike getalle)
sluit die telgetalle
 $\{1, 2, 3, \dots\}$, nul $\{0\}$,
en die negatief
van die telgetalle
 $\{-1, -2, -3, \dots\}$ in.

Kommutatiewe eienskap:

$$a + b = b + a$$

$$a \times b = b \times a$$

Assosiatiewe eienskap:

$$a + (b + c) = (a + b) + c$$

$$a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$$

Distributiewe eienskap:

$$a \times (b + c)$$

$$= a \times b + a \times c \text{ of } (a \times b) + (a \times c)$$



Wat sal gebeur
as ek al die a 's
negatief maak?

... al die a 's en b 's
negatief maak?

al die a 's, b 's
en c 's negatief
maak?

1. Identifiseer die laaste term in elke patroon. Wat sê die reël?

Voorbeeld: $-8, -7, -6, -5, -4, -3, -2$. -2 is die 7de term. Die reël is vorige term $+ 1$.

$-20, -18, -16, -14, -12, -10, -8$ Dit is die term.

Die reël is

2. Skryf die volgende in stygende volgorde:

$-5, 5, 15, 55, 10, -15, -10, -55$

3. Voltooi $<$, $>$, of $=$

a. 4 -4

b. -18 -8

c. -2 2

4. Bereken die volgende:

Voorbeeld: $(-7) + (5)$
 $= -7 + 5$
 $= -2$

a. $(-6) - (8) =$

b. $(-8) + (-4) =$

5. Bereken die volgende:

Voorbeeld: $(-5 - 4) \times (6 - 2)$
 $= -9 \times 4$
 $= -36$

a. $(-2 - 3) \div (-4 - 1)$

b. $(5 - 6) \times (8 - 7)$

6. Bereken die volgende:

Voorbeeld: $(-3 + 2) + (5 - 3) \times (8 - 9)$
 $= (-1) + (2) \times (-1)$
 $= -1 + (-2)$
 $= -1 - 2$
 $= -3$

$$(-7 + 5) \times (-2 - 7) + (-5 + 3) =$$

7. Kommutatiewe eienskap: Gebruik die voorbeeld as riglyn om die volgende te bereken:

Voorbeeld: $8 + (-3) = (-3) + 8 = 5$
 $8 \times (-3) = (-3) \times 8 = -24$

a. $33 + (-14) = \boxed{} = \boxed{}$

b. $7 \times (-6) = \boxed{} = \boxed{}$

8. Gebruik affekking om jou optelling te kontroleer, of doen dit andersom.

Voorbeeld: $8 + (-3) = 5$ dan
 $5 - 8 = -3$ of
 $5 - (-3) = 8$

a. $17 + (-8) = \boxed{} = \boxed{}$ $\boxed{} = \boxed{}$

b. $9 + (-5) = \boxed{} = \boxed{}$ $\boxed{} = \boxed{}$

9. Assosiatiewe eienskap: Gebruik die voorbeeld as riglyn om die volgende te bereken:

Voorbeeld: $[(-6) + 4] + (-1) = (-6) + [4 + (-1)] = (-6) + 3 = -3$

a. $[(-3) + 2] + (-4) = \boxed{} = \boxed{} = \boxed{}$

b. $[(-4) + (-10)] + 5 = \boxed{} = \boxed{} = \boxed{}$

10. Gebruik deling om te kontroleer, of doen dit andersom.

Voorbeeld: $5 \times (-6) = -30$ dan
 $-30 \div 5 = -6$ en
 $-30 \div (-6) = 5$

a. $6 \times (-8) =$

b. $4 \times (-2) =$

11. Voltooi die patroon.

Voorbeeld: $(+5) \times (+5) = 25$
 $(-5) \times (-5) = 25$
 $(+5) \times (-5) = -25$
 $(-5) \times (+5) = -25$

$$(+12) \times (+12) = \boxed{}$$

$$(-12) \times (-12) = \boxed{}$$

$$(+12) \times (-12) = \boxed{}$$

$$(-12) \times (+12) = \boxed{}$$

Probleemoplossing

As die antwoord 20 is en die berekening bevat drie bewerkings, wat kan die berekening dan wees?



Teken:

Datum:

Beskou hierdie voorbeelde en gee nog vyf voorbeelde by elkeen:

Egte breuk

$$\frac{3}{4}$$

Onegte breuk

$$\frac{8}{3}$$

Gemengde getal

$$1\frac{1}{2}$$

Onegte breuk na gemengde getal

$$\frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$$

Gemengde getal na onegte breuk

$$1\frac{1}{4} = \frac{5}{4}$$

1. Tel op en vereenvoudig die antwoord, indien nodig.

Voorbeeld:

$$\begin{aligned} \frac{6}{8} + \frac{4}{8} \\ = \frac{10}{8} \\ = 1\frac{2}{8} \\ = 1\frac{1}{4} \end{aligned}$$

a. $\frac{6}{12} + \frac{8}{12} =$

b. $\frac{3}{15} + \frac{7}{15} =$



Wanneer ons breuke optel, moet die noemers dieselfde wees.

2. Bereken en vereenvoudig die antwoord, indien nodig.

Voorbeeld:

$$\begin{aligned} \frac{2 \times 2}{3 \times 2} + \frac{3}{6} \\ = \frac{4}{6} + \frac{3}{6} \\ = \frac{7}{6} \\ = 1\frac{1}{6} \end{aligned}$$

a. $\frac{1}{4} - \frac{3}{8} =$

b. $\frac{3}{6} + \frac{7}{18} =$

3. Bereken en vereenvoudig die antwoord, indien nodig.

Voorbeeld:

$$\begin{aligned} \frac{2 \times 4}{3 \times 4} + \frac{3 \times 3}{4 \times 3} \\ = \frac{8}{12} + \frac{9}{12} \\ = \frac{17}{12} \\ = 1\frac{5}{12} \end{aligned}$$

a. $\frac{6}{5} + \frac{5}{6} =$

b. $\frac{3}{7} + \frac{7}{9} =$

4. Bereken en vereenvoudig die antwoord, indien nodig.

Voorbeeld: $\frac{2}{x} + \frac{3}{x}$
 $= \frac{2+3}{x}$
 $= \frac{5}{x}$

a. $\frac{6}{x} - \frac{5}{x} =$

b. $\frac{1}{x^2} + \frac{4}{x^2} =$

5. Bereken en vereenvoudig die antwoord:

Voorbeeld: $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}$
 $= \frac{6}{12}$
 $= \frac{1}{2}$

a. $\frac{5}{6} \times \frac{4}{7} =$

b. $\frac{6}{12} \times \frac{4}{5} =$

6. Vereenvoudig.

Voorbeeld: $\frac{3}{x} \times \frac{x}{4}$
 $= \frac{3x}{4x}$
 $= \frac{3}{4}$

a. $\frac{3}{x} \times \frac{x}{12} =$

b. $\frac{x}{21} \times \frac{14}{x} =$

7. Bereken en vereenvoudig die antwoord indien nodig.

Voorbeeld: $\frac{3}{4} \div \frac{2}{3}$
 $= \frac{3}{4} \times \frac{3}{2}$
 $= \frac{9}{8}$
 $= 1 \frac{1}{8}$

a. $\frac{4}{7} \div \frac{4}{6} =$

b. $\frac{9}{12} \div \frac{3}{4} =$

Probleemoplossing

Noem vyf breuke wat tussen twee tiendes en drie tiendes sal wees.

Wat is $\frac{5}{8} + \frac{8}{5}$ in die eenvoudigste vorm?

Wat is $\frac{3}{12} \times \frac{12}{4}$ in die eenvoudigste vorm?

Kan twee eenheidsbreuke een eenheidsbreuk gee as jy
 • dit optel?
 • dit vermenigvuldig?

As die antwoord $\frac{33}{99}$ is, wat is die twee breuke wat vermenigvuldig is? Is daar slegs een antwoord?



As $\frac{32}{40}$ (natuurlike getal) $\times$ $\frac{32}{40}$ (breuk) = hoeveel moontlike oplossings is daar dan vir hierdie som?

Vermenigvuldig enige twee onegte breuke en vereenvoudig jou antwoord, indien nodig.

Teken:

Datum:

Beskou die volgende. Wat beteken dit?



$$\frac{147}{100} = 1,47 = 147\%$$

Waar in ons alledaagse lewe gebruik ons:

- Desimale breuke?
- Persentasies?

1. Skryf elkeen van die volgende persentasies as 'n breuk en 'n desimale breuk.

Voorbeeld: 18% of $\frac{18}{100}$ of 0,18
 $= \frac{9}{50}$

a. 42%

b. 65,5%

2. Bereken:

Voorbeeld: 25% van R60
 $= \frac{25}{100} \times \frac{R60}{1}$
 $= \frac{R1500}{100}$
 $= R15,00$

a. 30% van R150

b. 65% van R125

3. Bereken die persentasiestyging (persentasie vermeerdering).

Voorbeeld:

Bereken die persentasiestyging as die prys van 'n buskaartjie van R60 tot R72 **verhoog** word.

$$\frac{12}{60} \times \frac{100}{1}$$

$$= \frac{1200}{60}$$

$$= 20\%$$

$\therefore$ 20% styging

Ons moet eers sê met hoeveel die prys van die buskaartjie gestyg het.

Dit het met R12 gestyg (R72 – R60 = R60).

Om dan die **persentasiestyging** uit te werk, moet ons $\frac{12}{60}$ met 100 (persentasie) vermenigvuldig.

Die prys het met $\frac{12}{60}$ of 20% gestyg.

R95 tot R125

Prysstyging: _____

4. Bereken die persentasiedaling (persentasieafname).

Voorbeeld:

Bereken die persentasiedaling as die prys van petrol van 25 sent per liter tot 17 sent daal. Die bedrag waarmee dit daal, is 8 sent.

$$\frac{8}{25} \times \frac{100}{1}$$

$$= \frac{800}{25}$$

$$= 32$$

∴ **32% styging**

Ons moet eers sê met hoeveel die petrolprys verlaag is.

Dit is met 8 c verlaag omdat 17 c + 8 c gelyk is aan 25 c.

Om die **persentasiedaling** dan uit te werk, moet ons $\frac{8}{25}$ met 100 vermenigvuldig.

R52 tot R46

Prysdaling: _____

5. Skryf die volgende in uitgebreide notasie:

Voorbeeld: 30,405 = 30 + 0,4 + 0,005

a. 39,482

b. 458,917

c. 873,002

d. 903,9301

6. Bereken met behulp van albei metodes. Kontroleer jou antwoord.

Voorbeeld 1: 2,37 + 4,53

$$= (2 + 4) + (0,3 + 0,5) + (0,07 + 0,03)$$

$$= 6 + 0,8 + 0,1$$

$$= 6,9$$

Voorbeeld 2:

$$2,37$$

$$+ 4,53$$

$$\hline 6,90$$

a. 89,879 – 39,999 =

b. 802,897 + 78,873 =

vervolg

Teken:

Datum:

xvii

Persentasies en desimale breuke

vervolg

7. Bereken die volgende antwoorde en kontroleer dit met 'n sakrekenaar te gebruik.

Voorbeeld:

$$0,4 \times 0,3 = 0,12$$

$$0,04 \times 0,3 = 0,012$$

$$0,04 \times 0,03 = 0,0012$$

a. $0,4 \times 0,5 =$

b. $0,04 \times 0,5 =$

c. $0,04 \times 0,05 =$

d. $0,6 \times 0,3 =$

e. $0,06 \times 0,3 =$

f. $0,06 \times 0,03 =$

g. $0,8 \times 0,7 =$

h. $0,08 \times 0,7 =$

i. $0,08 \times 0,07 =$

8. Bereken die volgende antwoorde en kontroleer dit met 'n sakrekenaar te gebruik.

Voorbeeld 1: $0,3 \times 0,5 \times 100$
 $= 0,15 \times 100$
 $= 15$

Voorbeeld 2: $0,7 \times 0,4 \times 10$
 $= 0,28 \times 10$
 $= 2,8$

a. $0,9 \times 0,4 \times 10 =$

b. $0,7 \times 0,06 \times 10 =$

9. Bereken die volgende antwoorde en kontroleer dit met 'n sakrekenaar te gebruik. Rond jou antwoorde af soos in die voorbeeld.

Voorbeeld: $4,387 \times 30$

$$= (4 \times 30) + (0,3 \times 30) + (0,08 \times 30) + (0,007 \times 30)$$

$$= 120 + 9 + 2,4 + 0,21$$

$$= 120 + 9 + 2 + 0,4 + 0,2 + 0,01$$

$$= 131,421$$

Naaste ene: 131

Naaste tiende: 131,4

Naaste honderdste: 131,42

a. $16,467 \times 40 =$

b. $298,999 \times 60 =$

10. Bereken die volgende. Rond jou antwoorde af tot die naaste tiende.

Voorbeeld: $9,81 \div 9$

$$= 1,09$$

1,09 afgerond tot die naaste tiende is 1,1.

a. $5,25 \div 5 =$

b. $72,08 \div 8 =$

c. $48,48 \div 6 =$

d. $39,97 \div 7 =$

Probleemoplossing

Vermenigvuldig die getal wat presies tussen 2,71 en 2,72 staan met die getal wat gelyk is aan tien maal drie.

Jy wil twaalf ewe lank stukke tou uit 'n 144,12 m tou sny. Hoe lank sal elke stukkies tou wees?

My ma het 77,12 m tou gekoop. Sy moet dit in agt stukkies verdeel. Hoe lank sal elke stukkies tou wees?

Teken:

Datum:

Wat sê elke stelling vir jou? Gee nog twee voorbeelde van elkeen.

Konstante verskil


Bv. $-3; -7; -11; -15$
 "Tel -4 by" of "Tel in -4 'e" of "Tel -4 by die vorige patroon by".

Konstante verhouding

Bv. $-2; -4; -8; -16; -32$
 "Vermenigvuldig die vorige term met 2 ."

Om nie 'n konstante verskil of verhouding te hê nie.

Bv. $1; 2; 4; 7; 11; 16$. "Maak die verskil tussen opeenvolgende terme elke keer groter met 1 ."



1. Wat is die konstante verskil tussen die opeenvolgende terme?

a. $8, 12, 16, 20$.

b. $7, 14, 21, 28$.

2. Wat is die konstante verhouding tussen die opeenvolgende terme?

a. $3, 9, 27, 81$

b. $9, -27, 81, -243$

3. Het hierdie patroon 'n konstante verskil of verhouding or nie een van die twee nie?

a. $1, 4, 10, 19$

b. $2, 4, 8, 16$

4. Wat is die konstante verskil of verhouding tussen die opeenvolgende terme?

a. $5, -15, 45, -135$

b. $6, 24, 96, 384$

5. Voltooi die tabel en gee dan die reël.

Voorbeeld:

Posisie	1	2	3	4	5	n
Waarde van die term	5	10	15	20	25	$n + 5$

Reël?

Die term $+ 5$.

a. Voltooi die tabel.


Posisie	2	4	6	8	n
Waarde van die term	4	8		16	

b. Dui die reël aan.

c. Wat sal die waarde van die 20ste term wees?

6. Wat sal die volgende patrone wees? Voltooi die vrae:

Seshoekgetalpatroon:



- a. Wat sal die volgende patroon wees? Trek dit deur van die reël gebruik te maak: Voeg een vuurhoutjie aan elke sy by (maak dus elke sy langer met een vuurhoutjie).

- b. Voltooi hierdie tabel deur dieselfde reël te gebruik.

Seshoek	1	2	3	4	5	6		10	n
Aantal vuurhoutjies									

7. Voltooi die volgende tabel. Beskryf dit.

Voorbeeld: 8, 15, 22, 29...

Term	1	2	3	4		18	n
Waarde van die term	8	15	22	29		127	$7(n) + 1$

- Tel 7 by die waarde van die vorige posisie.
- $7 \times$ die posisie van die term $+ 1$.
- $7(n) + 1$, waar " n " die posisie van die term is.
- $7(n) + 1$, waar " n " 'n natuurlike getal is.

13, 25, 37, 49,

Term	1	2	3	4	17	n
Waarde van die term						

vervolg ➡




Teken:

Datum:

8. Voltooi die volgende:

Voorbeeld:



$$t = p \times 2 + 3 \text{ (reël)}$$

$$0 \times 2 + 3 = 3 \text{ (} t = 3 \text{)}$$



$$2 \times 2 + 3 = 7 \text{ (} t = 7 \text{)}$$

$$4 \times 2 + 3 = 11 \text{ (} t = 11 \text{)}$$

$$6 \times 2 + 3 = 15 \text{ (} t = 15 \text{)}$$


$$8 \times 2 + 3 = 19 \text{ (} t = 19 \text{)}$$

Dit is die reël vir hierdie vloeiagram.



9. Wat is die reël?

Voorbeeld:



$$31 = 4(8) - 1$$



$$47 = 4(12) - 1$$

$$79 = 4(20) - 1$$

$$143 = 4(36) - 1$$

$$271 = 4(68) - 1$$

$$\text{Die reël is: } 4(p) - 1 = t$$



10. Beskryf die verwantskap tussen die getalle in die boonste ry en die getalle in die onderste ry in die tabel.

Voorbeeld:

x	0	1	2	20	50	100
y	5	7	9	45	105	205

Reël is $y = 2x + 5$

x	-2	-1	0	1	2	3
y	10	8	6	4	2	0

11. Beskryf die verwantskap tussen die getalle in die boonste ry en die getalle in die onderste ry in die tabel. Skryf die waardes van m en n neer.

Voorbeeld:

x	-2	-1	0	m	2	3
y	30	27	n	21	18	15

$m = 1$

$n = 24$

Reël is $y = -3x + 24$

x	-3	-2	m	0	1	2
y	-1	0	1	2	3	n

$m =$

$n =$

Reël is $y =$

Probleemoplossing


- As die konstante verhouding -7 is, wat kan 'n ry dan wees?
- As $t = g \times 4 - 9$, waar $g = -8$, wat is t dan?
- Die reël is $y = -x + (-2)$. Wys dit in 'n tabel, met $x = -3, -2, -1, 0, 1, 2$.



Teken:

Datum:

Hersien die volgende:



Sê of die volgende 'n:

- uitdrukking, of
 - vergelyking
- is, en verduidelik hoekom:

a) $x + 18 = 52$

b) $x + 18$

1. Bereken die volgende en onderstreep ook die veranderlike in rooi en die konstantes in blou:

Voorbeeld 1: $3a + 4a$
 $= 7a$

Let wel:
 $3a^2 + 4a^2$
is nie $7a^4$

Voorbeeld 2: $3a^2 + 4a^2$
 $= 7a^2$

Voorbeeld 3: $5x^2 + 4x^2 = 9x^2$

Voorbeeld 4: $5x + 4x^2 = 5x + 4x^2$

Voorbeeld 5: $3a^2 \times 4a^2$
 $= (3a^2)(4a^2)$
 $= 12a^4$

Voorbeeld 6: $3a^2 \div 4a^2$
 $= \frac{3a^2}{4a^2}$
 $= \frac{3}{4}$

a. $5a + 3a =$

b. $6m - 2m =$

c. $1a^2 + 2a^2 =$

d. $8r^2 + 5r^2 =$

e. $4x^2 + 2x^2 =$

f. $5x^2 + 5x =$

g. $2a \times 3a =$

h. $2c^2 \times 5c^2 =$

i. $1a \div 7a =$

j. $3f \div 5f =$

2. Voltooi:

Voorbeeld $4 \times \underline{\quad} = 1$
 $4 \times \frac{1}{4} = 1$

a. $5 \times \underline{\quad} = 1$

b. $7 \times \underline{\quad} = 1$

3. Los vir x op:

Voorbeeld 1: $2x = 16$
 $\frac{2x}{2} = \frac{16}{2}$
 $x = 8$

a. $3x = 27$

b. $5x + x = 18$

Voorbeeld 2: $x - 2 + 3 = -5$
 $x + 1 = -5$
 $x + 1 - 1 = -5 - 1$
 $x = -6$

c. $x + 3 + 2 = 4$

d. $x + 8 + 7 = -8$

Voorbeeld 3: $\frac{2x}{3} = 12$
 $\frac{2x}{3} \times 3 = 12 \times 3$
 $\frac{2x}{2} = \frac{36}{2}$
 $x = 18$

e. $\frac{4x}{6} = 12$

f. $\frac{x}{5} = 15$

4. Evalueer as $x = 2$:

Voorbeeld $2x + 5$
 $= 2(2) + 5$
 $= 4 + 5$
 $= 9$

a. $4x + 8 =$

b. $6 + 3x =$

Voorbeeld $x^2 + 5$
 $= (2)^2 + 5$
 $= 4 + 5$
 $= 9$

c. $x^2 + 2 =$

d. $x^2 + 11 =$

e. $x^2 - x =$

f. $3x - x^2 =$

vervolg ➡



Teken:

Datum:

5. Los vir x op:Voorbeeld 1: $-5x = 10$

$$\frac{-5x}{-5} = \frac{10}{-5}$$

$$x = -2$$

Voorbeeld 2: $2x - 6x = 16$

$$-4x = 16$$

$$\frac{-4x}{-4} = \frac{16}{-4}$$

$$x = -4$$

a. $-2x = 10$

b. $-6x = -12$

c. $4x - 5x = 8$

d. $8x + 4x = 4$

6. Bereken:

Voorbeeld 1: $\frac{x^4}{x^2}$

$$= \frac{x \cdot x \cdot x \cdot x}{x \cdot x}$$

$$= x \cdot x$$

$$= x^2$$

Hierdie is 'n monoom – dit het net een term.

a. $\frac{x^2}{x}$

b. $\frac{x^3}{x^2}$

Voorbeeld 2: $\frac{x^4 - x^2}{x^2}$

$$= \frac{x^2(x^2 - 1)}{x^2}$$

$$= x^2 - 1$$

Hierdie is 'n binoom – dit het twee terme wat deur 'n plus- of minus-teken verbind word.

c. $\frac{x^6 - x^2}{x^2} =$

d. $\frac{x^9 - x^3}{x^3} =$

Voorbeeld 3: $\frac{x^4 - 6x^2 - 1}{x^2}$

$$= \frac{x^4}{x^2} - \frac{6x^2}{x^2} - \frac{1}{x^2}$$

$$= x^2 - 6 - \frac{1}{x^2}$$

e. $\frac{x^4 - 2x^2 - 3}{x^2} =$

f. $\frac{x^6 - 2x^3 - 1}{x^3} =$

7. Hersiening: vereenvoudig die volgende met behulp van die distributiewe net:

Voorbeeld 1: $2(3 + 4)$

$$= 2 \times 3 + 2 \times 4$$

$$= (2 \times 3) + (2 \times 4)$$

$$= 6 + 8$$

$$= 14$$

2	3	4
	6	8

a. $2(3 + 6) =$

b. $4(8 + 1) =$

Voorbeeld 2: $2(x + 5)$

$$= (2 \times x) + (2 \times 5)$$

$$= 2x + 10$$

2	x	5
	2x	10

c. $2(x + 4) =$

d. $4(x + 7) =$

Voorbeeld 3: $2(x^2 + x + 3)$

$$= (2 \times x^2) + (2 \times x) + (2 \times 3)$$

$$= 2x^2 + 2x + 6$$

$$2(x^2 + x + 3)$$

$$= 2x^2 + 2x + 6$$

2	x^2	x	3
	$2x^2$	$2x$	6

e. $2(x^2 + x + 4) =$

f. $4(3 + x + x^2) =$

Probleemoplossing


Bettie het $8n$ albasters en Pieter het $3n$. Hoeveel het hulle altesaam? Skryf 'n getaltesin neer.

Teken:


Datum:

Wat vertel die grafieke of woorde ons omtrent die konsep?


Lineêr en nie-lineêr




Konstant, stygend en dalend




Maksimum of minimum



Diskreet of kontinu



1. Stip die volgende en skryf dit in woorde.

Voorbeeld: Die punt (5,7) is 5 ene links en 7 ene opwaarts.



- a. (3,7) is ene links , en ene opwaarts.
- b. (4,8) is ene links , en ene opwaarts.
- c. (5,9) is ene links , en ene opwaarts.
- d. (10,2) is ene links , en ene opwaarts.
- e. (0,6) is ene links , en ene opwaarts.

'n Parabool is 'n geboë lyn wat 'n punt maak wat so beweeg dat dit altyd ewe ver vanaf 'n vaste punt (die brandpunt) as vanaf die loodregte afstand van 'n vaste reguit lyn (die riglyn) is.

2. Voltooi die volgende:

a. Die linkerkantse () rigting word die x-as genoem.


b. Die (vertikale) rigting word die genoem.



c. Die y-as loop vertikaal deur die .

d. Waar die x-as die y-as kruis, is die "" punt. Jy meet alles vanaf hierdie punt.

e. Die x-as loop horisontaal deur die .



3. Voltooi die tabelle vir die vergelykings $y = x^2 + 4$ en $y = -x^2 + 4$ en stip (plot) dit dan op die assestelsel.

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
y	20								

$$y = (-4)^2 + 4$$

$$= 16 + 4$$

$$= 20$$

$$y = x^2 + 4$$

$$=$$

$$=$$

$$y = x^2 + 4$$

$$=$$

$$=$$

$$y = x^2 + 4$$

$$=$$

$$=$$

$$y = x^2 + 4$$

$$=$$

$$=$$

$$y = x^2 + 4$$

$$=$$

$$=$$

$$y = x^2 + 4$$

$$=$$

$$=$$

$$y = x^2 + 4$$

$$=$$

$$=$$

$$y = x^2 + 4$$

$$= 16 + 4$$

$$= 20$$

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
y	-12								

$$y = -(-4)^2 + 4$$

$$= -16 + 4$$

$$= -12$$

$$y = -x^2 + 4$$

$$=$$

$$=$$

$$y = -x^2 + 4$$

$$=$$

$$=$$

$$y = -x^2 + 4$$

$$=$$

$$=$$

$$y = -x^2 + 4$$

$$=$$

$$=$$

$$y = -x^2 + 4$$

$$=$$

$$=$$

$$y = -x^2 + 4$$

$$=$$

$$=$$

$$y = -x^2 + 4$$


$$=$$

$$=$$

$$y = -x^2 + 4$$

$$=$$

$$=$$



Die eerste parabool het 'n minimum punt (____, ____) en dit maak oop na bo (u-vormig).

Die tweede parabool het 'n maksimum punt (____, ____) en dit maak oop na onder (n-vormig).

Wat gebeur as jy 'n bal in die lug opgooi?



Die bal sal met 'n boog die hoogte inskiet en weer die afkomsag. Die pad wat die bal volg is 'n parabool.



Probleemoplossing

Beskryf die grafiek $y = x^2 + 10$.

Teken:

Datum:

Kan jy onthou wat die volgende beteken?



Wins is die surplus wat oorbly nadat die totale koste van die totale inkomste afgetrek is.

Tekort is wanneer meer as die inkomste bestee is.

Afslag is die bedrag wat voor die betaling van die vraprys afgetrek word.

Begroting is die beraming van koste en inkomste oor 'n gespesifiseerde tydperk.

'n **Lening** is 'n som geld wat 'n individu of 'n maatskappy aan 'n individu of maatskappy uitleen, met die doelwit om winste te maak wanneer die geld terugbetaal word.

Huurkoop is 'n stelsel waarvolgens 'n koper in gereelde paaiemente vir 'n bate betaal terwyl hy die gebruik daarvan geniet.

Die eienaarskap van die item gaan nie gedurende die terugbetalingstermyn aan die koper oor nie. Die titel gaan by volle betaling van die lening aan die koper oor.

Rente is die fooi wat 'n uitlener vir 'n lener vra om die geleende geld te gebruik, en dit word gewoonlik uitgedruk as 'n jaarlikse persentasie van die bedrag wat geleen word – dit word ook die rentekoers genoem.

Belasting op toegevoegde waarde (BTW)

is die belasting wat op alle goedere en dienste in Suid-Afrika betaal moet word. Die huidige BTW-koers is 14%. Sommige noodsaaklike voedselitems word hiervan vrygestel – dit beteken dat dit 'n 0% BTW-koers het.

'n **Wisselkoers** is die huidige markprys waarteen een geldeenheid vir 'n ander geruil kan word.

1. Los die volgende finansiële probleme op:

- a. Kabelo ontvang R120 sakgeld per week. Hy gaan twee keer kegelbal speel (wat R20,00 per sessie kos, BTW uitgesluit). Hy drink koffie vir R5,00 en koop R30,00 se lugtyd – BTW in albei gevalle uitgesluit. Hoeveel sakgeld kan hy na die volgende week oordra?

b. Jy het verlede maand die volgende uitgawes gehad: Fliek R60,00; huurmotor R90,00; roomys R5,75; nuwe hemp R65,00; skenking aan liefdadigheid R50,00; skryfbehoeftes R45,00; herstelwerk aan jou fiets R150,00. Jy ontvang R400 sakgeld per maand vir die takies wat jy in en om die huis verrig. Tot op hede het jy R375,00 gespaar. Voltooi die begrotingsvorm om uit te vind of jy enigiets kan spaar en of jy van jou spaargeld sal moet gebruik om jou uitgawes te betaal.

	Begroting	Werklike bedrag	Verskil
Inkomste Sakgeld	R400	R400	
Uitgawes			
Huurmotor			
Fliek			
Lekkergoed			
Klere			
Skenkings			
Spaargeld			
Skryfbehoeftes			
Geraamde totale uitgawes			
Netto inkomste			



Teken:

Datum:

vervolg ➡

xxx

- c. 'n Totaal van R36 000 is in twee rekenings belê. Een rekening het 7% rente per jaar en die ander een 9% per jaar verdien. Die totale jaarlikse rente wat verdien is, was R2 920. Hoeveel is in elke rekening belê?

- d. Dawid koop 'n nuwe motor op huurkoop. Die motor kos R75 000 (BTW uitgesluit) en hy ruil sy ou motor (wat ten volle afbetaal is) vir R9 500 in. Die motorregistrasie, dokumentasie en lisensiegelde was R2 000. Wat is sy paalement as hy rente betaal teen 7% p.j., enkelvoudig saamgestel, en dit oor 'n tydperk van 54 maande terugbetaal?

e. Lindie het €45. Sy wil graag 'n denimbreek vir CAD \$15 en 'n T-hemp vir CAD \$10 koop. Hoeveel geld in ZAR sal sy oorhê nadat sy alles gekoop het?

Gebruik die wisselkoerse in die tabel hierna om jou te help om die woordsomme op te los. Wys jou bewerkings in die ruimte wat daarvoor voorsien is.

	ZAR (R)	USD (\$)	GBP (£)	CAD (\$)	EUR (€)	AUD (\$)
ZAR	1,00	6,76	11,06	6,89	9,88	7,17
USD (\$)	0,15	1,00	1,60	0,92	1,46	0,87
GBP (£)	0,09	1,09	1,00	0,58	0,91	0,55
CAD (\$)	0,15	1,09	1,74	1,00	1,59	0,95
EUR (€)	0,10	0,69	1,10	0,63	1,00	0,60
AUD (\$)	0,14	1,15	1,83	1,05	1,67	1,00

Voorbeeld: 1 ZAR (R) = 0,15 USD (\$)

1 USD (\$) = 6,76 ZAR (R)

Probleemoplossing

Maak aantekeninge van die belangrike finansiële wenke wat jy geleer het en vertel 'n familielid daarvan.



Teken:

Datum:

Meetkundige figure

Simbole wat jy moet hersien of leer:

Driehoek 	Hoek 	Loodreg 	Parallel 	Grade 	Regte hoeke 
Lynsegment 	Lyn 	Radius (straal) 	Kongruent 	Gelykvormig 	Dus 

Meetkundige figure om te onthou:

Meetkundige figure		
Driehoeke	Vierhoek	Nog poligone
Gelyksydige driehoek	Parallelogram	Pentagoon (vyfhoek)
Gelykbenige driehoek	Reghoek	Heksagoon (seshoek)
Ongelyksydig driehoek	Vierkant	Heptagoon (sewehoek)
	Ruit	Oktagoon (agthoek)
	Trapecium	Nonagoon (negehoek)
	Vlieër	Dekagoon (tienhoek), ens.
Bogenoemde is alles poligone.		

Hoeke om te onthou:

Skerphoek: 'n hoek wat kleiner as 90° is.**Regte hoek:** 'n hoek wat 90° is.**Stomphoek:** 'n hoek wat groter as 90° maar kleiner as 180° is.**Gestrekte hoek:** 'n hoek wat presies 180° is.**Inspringende hoek:** 'n hoek wat groter as 180° is.

'n Poligoon is 'n meetkundige figuur met drie of meer reguit sye.



Hoe sou jy die totale som van die binnehoeke van 'n poligoon bereken?

Gelykvormige en kongruente driehoeke

Gelykvormige driehoeke het dieselfde vorm, maar is nie ewe groot nie. Elke paar ooreenstemmende hoeke is gelyk, en die verhouding van enige paar ooreenstemmende sye is dieselfde.

Kongruente driehoeke is driehoeke wat ewe groot is en dieselfde vorm het. Dit beteken dat die ooreenstemmende sye gelyk is en dat die ooreenstemmende hoeke ook gelyk is.

1. Konstrueer die volgende met behulp van geskikte instrumente en beantwoord die vrae:

a. 'n Hoek kleiner as 90° .	b. 'n Poligoon met meer as vier sye.	c. 'n driehoek.
i. Benoem die hoek.	i. Bereken die binnehoeke van die poligoon.	i. Teken 'n driehoek wat kongruent is aan die driehoek hierbo. Benoem die driehoek.
ii. Konstueer nog 'n hoek sodat die hoek en dié hoek hierbo saam 90° is. Wat noem ons so 'n hoek paar?	ii. Waar kan ons so 'n vorm in ons alledaagse lewe kry?	ii. Teken 'n driehoek wat gelykvormig is aan een van die driehoeke hierbo. Benoem die driehoek.




Teken:

Datum:

vervolg

xxxv

2. Beskryf die konstruksies deur die woorde hierna te gebruik:



Parallele lyne



Snylyn

Regoorstaande hoeke:

$$a = d; b = c;$$

$$e = h; f = g$$

Ooreenstemmende hoeke:

$$a = e; b = f;$$

$$c = g; d = h$$

Verwisselende binnehoeke

$$c = f; d = e$$

Verwisselende buitehoeke

$$a = h; b = g$$

Opeenvolgende binnehoeke

$$c + e = 180^\circ$$

$$d + f = 180^\circ$$

(ook benoem ko-binnehoeke)

a.



Blank area for writing answers, featuring horizontal dashed lines.

b.

'n **Diagonaal** (hoeklyn) is 'n reguitlyn binne 'n vorm wat een hoekpunt met 'n ander verbind, maar is nie 'n kant van daardie vorm nie.



A large rectangular area with horizontal dashed lines for writing.

3. Kan jy enige diagonale identifiseer? As jy nie kan nie, trek dan 'n paar daarvan.

Probleemoplossing





In watter pos, buiten dié van ingenieur, is dit nodig dat mense hoeke moet bereken? Gee 'n voorbeeld van so 'n posbeker en sê hoekom die persoon hoeke bereken.




Teken:

Datum:

Beskryf hierdie transformasies:



1. Beantwoord die volgende vrae:




a. A, B en C se koördinate is:

b. A', B' en C' koördinate is:

c. Die translasevektor is

d. Verduidelik die translasevektor in woorde.

2. Beantwoord die volgende vrae:



a. A, B en C se koördinate is:


b. A' B en C' se koördinate is:

c. ABC word oor die gereflekteer.

d. Watter koördinate bly dieselfde?

e. Watter koördinate verskil?

3. Beantwoord die volgende vrae:




a. A, B en C se koördinate is:

b. A', B' en C' se koördinate is:

c. Vergelyk die ooreenstemmende hoekpunte.

4. Beantwoord die volgende vrae:



a. $A'B' = \frac{\quad}{\quad} \times AB$

b. $B'C' = \frac{\quad}{\quad} \times BC$

c. $A'C' = \frac{\quad}{\quad} \times AC$

d. Ons sê dus dat die transformasie 'n **vergroting** met **skaalfaktor** =

 is.

Probleemoplossing

Ontwerp 'n huis op grafiekpapier (bo-aansig).

Vergroot jou plan met 'n skaalfaktor van 2.

Reflekter die huis, roteer dit met 90 grade en transleer dit met 2 ene links en met 3 ene af.

Teken:

Datum:

Wat het al hierdie meetkundige objekte in gemeen?





kubus

twintigvlak

twaaflvlak

agtvlak


viervlak



Wat noem ons hierdie groep meetkundige objekte?


1. Skryf die naam van die geometriese voorwerp neer wat elkeen van die nette sal vorm. Hoeveel kante, hoekpunte en aansigte het elkeen? Voltooi die tabel hieronder.

a.



twaaflvlak


b.



c.



d.



Beskryf elkeen.

e.

30 kante
20 hoekpunte
12 vlakke

f.

g.

h.

2. Voltooi die volgende:

a. As die sye van 'n meetkundige figuur ewe lank is en die binnehoeke is ewe groot, dan is die meetkundige figuur .

As dit nie gelyk is nie, is dit .

b. Wat sien jy raak as jy na die vlakke van 'n platoniese vaste liggaam kyk?


c. Wat noem ons meetkundige vaste liggame as al die vlakke kongruent is?

d. Noem drie meetkundige vaste liggame wat onreëlmatig is.

3. Konstrueer die net vir 'n viervlak. Ons voorsien die eerste twee stappe.


Stap 1:

Trek 'n gelyksydige driehoek. Noem die sye ABC.





Stap 2:


Trek nog 'n gelyksydige driehoek, met een basis wat met basis AB van die eerste driehoek verbind is.




4. Beskryf die verskillende aansigte van die gebou met behulp van die volgende sketse.




a.



b.



c.



d.


5. Trek 'n kubus deur 'n 30° skuins projeksie te gebruik.

Stap 1: Trek 'n vierkant.



Stap 2

Trek 'n 30°-lyn vanaf die regterkantse onderste hoekpunt.



Stap 3

Trek die res van die kubus.



Onthou dat die lyne, wat in die reële driedimensionele objek parallel is, in die skets parallel bly.



Probleemoplossing

Gebruik herwinde materiaal en maak skelette (buitelyne) van al die platoniese vaste liggame.

Teken:

Datum:

Hersien die formules:

Omtrek van 'n reghoek $2l + 2b$ Oppervlakte van 'n reghoek: $l \times b$	Omtrek van 'n sirkel $C = \pi d$ of $2\pi r$
Omtrek van 'n vierkant: $4l$ Oppervlakte van 'n vierkant: $l \times l$	Oppervlakte van 'n sirkel $A = \pi r^2$
Die oppervlakte van 'n driehoek is: $\frac{1}{2} b \times h$	

Beskou hierdie omsettings:

$1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$ $1 \text{ cm}^2 (1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm})$ $= 100 \text{ mm}^2 (10 \text{ mm} \times 10 \text{ mm})$
$1 \text{ m} = 1\,000 \text{ mm}$ $1 \text{ m}^2 (1 \text{ m} \times 1 \text{ m})$ $= 1\,000\,000 \text{ mm}^2 (1\,000 \text{ mm} \times 1\,000 \text{ mm})$
$1 \text{ km} = 1\,000 \text{ m}$ $1 \text{ km}^2 (1 \text{ km} \times 1 \text{ km})$ $= 1\,000\,000 \text{ m}^2 (1\,000 \text{ m} \times 1\,000 \text{ m})$

1. Bereken die omtrek en oppervlakte van 'n vierkant. Skryf jou antwoord in mm.

Voorbeeld: sy 4,5 cm

Omtrek

$$P = 4 \times l$$

$$= 4 (4,5 \text{ cm})$$

$$= 18 \text{ cm}$$

Oppervlakte

$$A = l^2$$

$$= 4,5 \text{ cm} \times 4,5 \text{ cm}$$

$$= 20,25 \text{ cm}^2$$

Skryf jou antwoord in mm.

$$= 4 (45 \text{ mm})$$

$$= 180 \text{ mm}$$

$$= 45 \text{ mm} \times 45 \text{ mm}$$

$$= 2\,025 \text{ mm}^2$$

As die oppervlakte $2\,025 \text{ mm}^2$ is, wat sal die antwoord in cm^2 wees?

$$1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$$

$$1 \text{ cm}^2 = 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$$

$$1 \text{ cm}^2 = 10 \text{ mm} \times 10 \text{ mm}$$

$$1 \text{ cm}^2 = 100 \text{ mm}^2$$

$$\therefore \left(\frac{2\,025 \text{ mm}^2}{100} \right) \text{ cm}^2$$

$$= 20,25 \text{ cm}^2$$

Sy 3,5 cm

2. Bereken die oppervlakte en omtrek van 'n reghoek. Skryf jou antwoord in mm.

Voorbeeld: lengte 3,8 cm, breedte 2,1 cm

Omtrek

$$P = 2(l + b)$$

$$= 2(3,8 \text{ cm} + 2,1 \text{ cm})$$

$$= 2(5,9 \text{ cm})$$

$$= 11,8 \text{ cm}$$

Oppervlakte

$$A = l \times b$$

$$= 3,8 \text{ cm} \times 2,1 \text{ cm}$$

$$= 7,98 \text{ cm}^2$$

$$\begin{aligned}
 1 \text{ m} &= 100 \text{ cm} \\
 1 \text{ m}^2 &= 100 \text{ cm} \times 100 \text{ cm} \\
 1 \text{ m}^2 &= 10\,000 \text{ cm}^2
 \end{aligned}$$

Skryf jou antwoord in mm^2 en m^2 .

$$\text{mm}^2$$

$$7,98 \text{ cm}^2$$

$$= 7,98 \times 100 \text{ mm}^2$$

$$= 798 \text{ mm}^2$$

$$\begin{aligned}
 1 \text{ cm} &= 10 \text{ mm} \\
 1 \text{ cm}^2 &= 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} \\
 1 \text{ cm}^2 &= 10 \text{ mm} \times 10 \text{ mm} \\
 1 \text{ cm}^2 &= 100 \text{ mm}^2
 \end{aligned}$$

$$\text{m}^2$$


$$= \frac{7,98 \text{ cm}^2}{10\,000}$$

$$= 0,000798 \text{ m}^2$$

Lengte 9,3 cm en breedte 7,2 cm

3. Bereken die oppervlakte van 'n driehoek. Skryf jou antwoord in mm.

Voorbeeld:



Oppervlakte

$$A = \frac{1}{2} b \times h$$

$$= \frac{1}{2} (5 \text{ cm}) \times 2,3 \text{ cm}$$

$$= 2,5 \text{ cm} \times 2,3 \text{ cm}$$

$$= 5,75 \text{ cm}^2$$

Skryf jou antwoord in mm^2

$$5,75 \text{ cm}^2$$

$$(5,75 \text{ cm}^2 \times 100) \text{ mm}^2$$

$$= 575 \text{ mm}^2$$

Skryf jou antwoord in m^2

$$\left(\frac{5,75 \text{ cm}^2}{10\,000} \right) \text{ m}^2$$

$$= 0,000575 \text{ m}^2$$

Basis = 8 cm Hoogte = 2,6 cm

4. Bereken die oppervlakte van die sirkels.

Voorbeeld: Radius is 3 cm.

$$A = \pi r^2$$

$$= (3,14159) (3 \text{ cm})^2$$

$$= 28,27 \text{ cm}^2$$

a Die radius van die sirkels is 4 cm.

b. Die radius van die sirkels is 2,5 cm.

Probleemoplossing

As die oppervlakte van die sirkel $314,159 \text{ cm}^2$ is, wat is die radius?


Teken:

Datum:

Volume en buite-oppervlakte

Hersien die volgende formules:


Die volume van 'n kubus
 $v = l^3$



Die volume van 'n reghoekige prisma
 $v = l \times b \times h$



Die volume van 'n driehoekige prisma
 $v = \frac{1}{2} (b \times h) \times l$



Buite-oppervlakte van 'n prisma



A = die som van die oppervlakte van al die vlakke

Hersien die volgende:

- As $1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$ dan is $1 \text{ cm}^3 = 1000 \text{ mm}^3$.
- As $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$ dan is $1 \text{ m}^3 = 1\,000\,000 \text{ cm}^3$ of 10^6 cm^3 .
- 'n Objek met 'n volume van 1 cm^3 sal presies 1ml water verplaas.
- 'n Objek met 'n volume van 1 m^3 sal presies 1 kl water verplaas.

1. Bereken die volume, kapasiteit en buite-oppervlakte van 'n kubus.

Voorbeeld:


Volume	Kapasiteit	Buite-oppervlakte																
 4 cm $v = l^3$ $v = (4 \text{ cm})^3$ $v = 64 \text{ cm}^3$	Let wel: 'n Objek met 'n volume van 1 cm^3 sal 1 ml water verplaas. 'n Objek wat 64 cm^3 is, sal dus 64 ml water of 0,064ℓ verplaas.	Net van die kubus. Hoeveel vlakke (oppervlakke) is daar? 																
<table><tr><th>Kubieke mm</th><th>Kubieke cm</th><th>Kubieke m</th><th>Liter</th></tr><tr><td>1 000 000 000</td><td>1 000 000</td><td>1</td><td>1 000</td></tr><tr><td>1 000 000</td><td>1 000</td><td>0,001</td><td>1</td></tr><tr><td>1 000</td><td>1</td><td>0,000001</td><td>0,001</td></tr></table>			Kubieke mm	Kubieke cm	Kubieke m	Liter	1 000 000 000	1 000 000	1	1 000	1 000 000	1 000	0,001	1	1 000	1	0,000001	0,001
Kubieke mm	Kubieke cm	Kubieke m	Liter															
1 000 000 000	1 000 000	1	1 000															
1 000 000	1 000	0,001	1															
1 000	1	0,000001	0,001															
Buite-oppervlakte = som van die oppervlaktes van al die vlakke. $= 6$ (oppervlakte van 'n vlak) $= 6a^2$ $= 6 (4 \text{ cm})^2$ $= 6 \times 16 \text{ cm}^2$ $= 96 \text{ cm}^2$																		

Die kant van die kubus is 2,5 cm lank.

Volume	Kapasiteit	Buite-oppervlakte

2. Bereken die volume, kapasiteit en buite-oppervlakte van 'n reghoekige prisma.

Voorbeeld:

Volume	Kapasiteit	Buite-oppervlakte
 4 cm 2 cm 1,5 cm $v = l \times b \times h$ $v = 4 \text{ cm} \times 1,5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ $v = 12 \text{ cm}^3$	Let wel: 'n Objek met 'n volume van 1 cm^3 sal 1 ml water verplaas. $\therefore$ 'n Objek wat 12 cm^3 is sal dus 12 ml water verplaas.	Net van die kubus. Hoeveel vlakke (oppervlakke) is daar?  4 cm 2 cm 1,5 cm Buite-oppervlakte $A = 2lb + 2lh + 2bh$ $= 2(4 \text{ cm} \times 1,5 \text{ cm}) + 2(4 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}) + 2(1,5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm})$ $= 12 \text{ cm}^2 + 16 \text{ cm}^2 + 6 \text{ cm}^2$ $= 34 \text{ cm}^2$

Kubieke mm	Kubieke cm	Kubieke m	Liter
1 000 000 000	1 000 000	1	1 000
1 000 000	1 000	0,001	1
1 000	1	0,000001	0,001



Volume en buite-oppervlakte vervolg

Die reghoek se dimensies is: lengte = 4,5 cm; breedte = 3,5 cm en hoogte 4 cm.

Volume	Kapasiteit	Buite-oppervlakte

3. Bereken die volume, kapasiteit en buite-oppervlakte van 'n driehoekige prisma.

Voorbeeld:

Volume	Kapasiteit	Buite-oppervlakte
 $v = \frac{1}{2} b \times h \times l$ $v = \frac{1}{2} (5 \text{ cm}) \times 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ $v = 2,5 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ $v = 15 \text{ cm}^3$	Let wel: 'n Objek met 'n volume van 1 cm^3 sal 1 ml water verplaas. $\therefore$ 'n Objek wat 15 cm^3 is, sal 15 ml water verplaas	Net van die driehoekige prisma. Hoeveel vlakke (oppervlakke) is daar? Gebruik Pythagoras om dit te bereken.  Buite-oppervlakte $A = 2 (\text{oppervlakte van driehoek}) + \text{oppervlakte van 3 reghoeke}$ $= 2 \left(\frac{1}{2} (5 \text{ cm}) \times 3 \text{ cm} \right) + 2(3,9 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}) + 1(5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm})$ $= 15 \text{ cm}^2 + 15,6 \text{ cm}^2 + 10 \text{ cm}^2$ $= 40,6 \text{ cm}^2$

Die reghoekige prisma se dimensies is: basis van driehoek 4 cm, hoogte van driehoek 2.5 cm, lengte van prisma 5 cm en die ander twee sye van die driehoek 3,2 cm elk.

Volume	Kapasiteit	Buite-oppervlakte

Probleemoplossing

- As die volume van 'n kubus $10\,648\text{ cm}^3$ is, wat is die dimensies daarvan in mm en m?
- Gee alledaagse voorbeelde van waar ons die volume, kapasiteit en die buite-oppervlakte van die volgende kan gebruik:
 - kubusse,
 - reghoekige prisma's, en
 - driehoekige prisma's

Hersien: Kyk na die datahanteringsiklus en beskryf dit.



Hipotese: Graad 9-meisies doen beter in wiskunde en wetenskap as graad 9-seuns?

'n **Hipotese** is 'n stelling of voorspelling waarvoor grondige bewyse dat dit waar is, nou gevind moet word.

Hier volg 'n paar voorbeelde van hipoteses:

- By my skool het almal in graad 9 'n selfoon.
- Alle graad 9-leerders hou van gemorskos.

1. Stel jou navorsingspan saam.

Die name van jou navorsingspan:



2. Wat is die doel van jou navorsing?

3. Wat is jou hipotese?

Primêre data

Populasie

Sekondêre
data

Opname

Vraelys

Steekproef

4. Vrae wat jou kan help om te beplan:

a. Watter data het jy nodig?

b. By wie kan jy dit kry?

c. Hoe gaan jy dit insamel?

d. Hoe gaan jy dit aanteken?

e. Hoe gaan jy seker maak die data is betroubaar?

f. Hoekom? Gee redes vir die keuse wat jy uitgeoefen het.



Teken:

Datum:

vervolg ➡

xlix

Tabelle
Tellings
Blaar-en-
stingel-tabelle

omvang
gemiddelde
mediaan
modus

7. Gebruik die data wat jy ingesamel en aangeteken het om die volgende te doen:

a. Organiseer jou data in 'n frekwensietabel.

b. Bereken die gemiddelde, mediaan en modus.

c. Bereken die omvang van die data.

d. Maak 'n blaar-en-stingel-voorstelling.

e. Stel jou data in 'n grafiek voor. Jy kan meer as een tipe grafiek daarvoor gebruik.

Probleemoplossing

Interpreteer jou grafieke en tabelle en skryf 'n verslag deur die volgende opskrifte te gebruik:

1. Doel
2. Hipotese
3. Plan
4. Data-insameling
5. Ontleding
6. Gevolgtrekkings
7. Bylaes
8. Verwysings



Teken:

Datum:



Notas

Lined area for notes.



Graad **9**

W i s k u n d e

DEEL
2


WERKBLAAIE

1 tot 64

AFRIKAANS
Boek
1

Reële getalle, rasionale getalle en irrasionale getalle

Diagrammatiese voorstelling van die reële getalstelsel.



$N \subset Z \subset Q \subset A \subset R$
 ($\subset$ = deelversameling van)

1. Bestudeer hierdie definisies:

Natuurlike getal (N vir natuurlik)

Natuurlike getalle is die telgetalle $\{1, 2, 3, \dots\}$, (N_1) die positiewe heelgetalle van die telgetalle $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$ (N_0). Wiskundiges gebruik die term “natuurlik” in albei gevalle.

Heelgetal (Z vir Zahlen = “getalle” in Duits)

Heelgetalle is die natuurlike getalle of telgetalle en die negatiewe getalle daarvan negatives ($\dots -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$).

Rasionale getal (Q vir *quotient* – kwosiënt)

Rasionale getalle is getalle wat uitgedruk kan word as ‘n breuk van ‘n heelgetal (dit wil sê as ‘n verhouding van ‘n heelgetal). Rasionale getalle kan opgetel, afgetrek, vermenigvuldig en gedeel word, byvoorbeeld $\frac{1}{2} = 0.5$ of $\frac{1}{3} = 0.333\dots$. Rasionale desimale ontwikkelings eindig of repeteer.

Reël-algebraïese getal (A_R vir Algebraïes_{Reël})

‘n Reël-algebraïese getal word gedefinieer as ‘n getal wat die wortel van ‘n polinoom met rasionale koëffisiënte is. Reël-algebraïese getalle kan rasionaal of irrasionaal wees. Die getal $\sqrt{2} = 1.41421\dots$ is ‘n reël-algebraïese getal wat irrasionaal is.

Reële getal (R vir reël)

Reële getalle is al die getalle (al die punte) op die kontinue, oneindige lang getalleryn met geen gapings nie. Dit is ‘n versameling van elke moontlike oneindige ontwikkeling. Reële getalle kan **rasionaal** of irrasionaal wees asook algebraïes of nie-algebraïes (**transendentiaal**). Die getalle $\pi = 3.14159\dots$ en $e = 2.71828\dots$ is transendentiaal. ‘n Transendentale getal kan nooit as ‘n presiese breuk van ‘n heelgetal geskryf word nie; dit word deur ‘n oneindige reeks van **termyn**e gedefinieer.

Irrasionale getalle

Hierdie getalle kan nie as breuke van heelgetalle geskryf word nie. Irrasionale desimale ontwikkelings eindig of repeteer glad nie.

Transendentale getalle

Dit is irrasionale getalle wat nie deur ‘n rekenkundige bewerking teruggekonstitueer kan word as ‘n heelgetal nie.

Reële getalle, rasionale getalle en irrasionale getalle vervolg

2. Pas hierdie beskrywings by die regte getallelyn. Begin by "Heelgetal, Z".


'n Getal wat uitgedruk kan word as 'n breuk van 'n heelgetal

Al die getalle


Natuurlike getalle en hul negatiewe

Rasionele of irrasionale getalle


Natuurlike, N




Heelgetal, Z




Rasionele, Q



Reël-algebraïese, A_R



Reële, R



3. Wat beteken die intervale tussen die heelgetalle op die getallelyne op die vorige bladsy?

i. Rasionale

ii. Reël-algebraïese

iii. Reële

4. Voltooi die tabel, soos in voorbeeld a.

		Telgetal	Natuurlike getal	Heelgetal	Rasionale getal	Irrasionale getal	Reële getal
a	200	✓	✓	✓	✓		✓
b	-29						
c	0						
d	1						
e	$\frac{12}{50}$						
f	0,987						
g	$\sqrt{81}$						
h	$\sqrt{5}$						
i	π						
j	124,54						
k	$\frac{22}{7}$						
l	$\sqrt{25 + 9}$						

Probleemoplossing



Die getal **e** (Euler se getal) is 'n beroemde irrasionale getal. Hoekom?

Teken:

Datum:

Bestudeer hierdie faktoriseringsmetodes.

Metode 1:

Trapleermetode.

$$\begin{array}{r|l} 12 & 2 \\ 6 & 2 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array}$$

In hierdie voorbeeld is elke faktor 'n priemgetal.

Ons kan dit skryf as:

$$2 \times 2 \times 3 = 12$$

Of

$$2^2 \times 3 = 12$$

Metode 2:

Wat is die priemfaktore van 12?
Breek 12 op in 4×3 .


Die priemfaktore van 4 is 2 en 2.
Die priemfaktor van 3 is 3.

Die priemfaktore van 12 is dus 2, 2 en 3.

Ons kan dit skryf as $2 \times 2 \times 3 = 12$

of

$$2^2 \times 3 = 12$$

Metode 3:

Onthou, dit is belangrik om jou deelbaarheid reëls te ken wanneer jy met priem-getalle werk.

**1. a. Faktoriseer 15**

Metode 1:	Metode 2:	Metode 3:

b. Faktoriseer 72

Metode 1:	Metode 2:	Metode 3:

Voordat jy aangaan met vraag c. tot d., moet jy sê van watter metode jy die meeste hou en hoekom.

c. Faktoriseer 95

Metode 1:	Metode 2:	Metode 3:

d. Faktoriseer 100

Metode 1:	Metode 2:	Metode 3:

2. Priemfaktoriserings word gebruik om te bepaal watter priemgetalle saam vermenigvuldig kan word om by die oorspronklike getal uit te kom. As jy priemfaktoriserings ken, sal dit jou later baie in wiskunde help. Hoekom? Lees die strokiesprent. Elke keer as 'n karakter sê, "kom ek probeer", moet jy dit self probeer doen.

a. Die belangrikheid van priemgetalle is dat enige heelgetal in 'n produk van priemgetalle ontbind kan word.  Gee 'n voorbeeld hiervan. 	b. Jy wil moontlik weet hoe baie verskillende getallepare vermenigvuldig kan word om 360 te kry. Jy kan begin deur dit neer te skryf.  Kom ek probeer. 
c. Ek hoop jy het niks oorgeslaan nie. Skryf nou 360 as 'n produk van priemfaktore.  Kom ek probeer. 	d. Jy sal sien dat elke saamgestelde faktor van 360 'n produk van 'n deelversameling van die priemfaktore is.  Kom ek probeer. 

Probleemoplossing

Priemgetalle is getalle wat net deur een en hulself gedeel kan word. Demonstreer dit deur al die getalle tussen 100 en 200 te gebruik.

Teken:

Datum:

Probleme oor die afstand wat binne 'n bepaalde tyd afgelê word, kan opgelos word deur formules te gebruik.

Om afstand te bepaal:

$$\text{Afstand} = \text{Spoed} \times \text{Tyd}$$

$$d = s \times t$$

Om tyd te bepaal:

$$\text{Tyd} = \frac{\text{Afstand}}{\text{Spoed}}$$

$$t = \frac{d}{s}$$

Om spoed (koers) te bepaal:

$$\text{Spoed} = \frac{\text{Afstand}}{\text{Tyd}}$$

$$s = \frac{d}{t}$$

Wanneer ons probleme met behulp van hierdie formules oplos, gebruik ons verhouding en eweredigheid.

'n Verhouding is 'n manier om die groottes van twee of meer hoeveelhede te vergelyk. Dus is 4:7 en 8:14 verhoudings.

'n Eweredigheid is 'n stelling dat twee verhoudings gelyk is. Dus is 4:7 eweredig aan 8:14 (wat beteken dat 4 tot 7 is wat 8 tot 14 is).

'n Eweredigheid kan op twee maniere geskryf word:

- as twee gelyke breuke $\frac{4}{7} = \frac{8}{14}$ of
- op hierdie manier $4 : 7 = 8 : 14$

Wanneer twee verhoudings gelyk is, dan is die "kruisprodukte" van die verhoudings gelyk. Vir die eweredigheid van $a:b::c:d$ jy kan vermenigvuldig $a \times d = b \times c$, soos in hierdie voorbeeld:

$$\frac{4}{7} = \frac{8}{14} \text{ dus is } 4 \times 14 = 56 \text{ en } 7 \times 8 = 56$$

Voorbeeld: My gesin het 300 km teen 'n koers van 60 km per uur afgelê. Hoe lank het hulle gereis?

Die koers van "km per uur" gee die afstand wat per ene tyd afgelê is.

Wat wil ons vasstel? Die tyd.

Gebruik "kruisprodukte".



Ons kan 'n formule gebruik of met verhoudings en eweredigheid werk.

Formule om tyd te bepaal:

$$\text{Tyd} = \frac{\text{Afstand}}{\text{Koers}}$$

$$\text{Tyd} = \frac{300}{60} = 5 \text{ ure}$$

Om met verhoudings en eweredigheid te werk:

$$\frac{60 \text{ km}}{1 \text{ h}} = \frac{300 \text{ km}}{t}$$

$$60 \times t = 300 \times 1$$

$$60t = 300$$

$$\frac{60t}{60} = \frac{300}{60}$$

$$t = 5$$

1. Voltooi die tabel

	Koers	Tyd	Afstand	Formule
a.	90 km/h	?	11 700 km	
b.	50 km/h	8 uur	?	
c.	120 km/h	?	61 200 km	
d.	500 km/h	2 uur 30 minute	?	
e.	1 000 km/h	?	20 000 m	

2. 'n Motor ry 60 km binne 36 minute. Hoe ver sal dit teen dieselfde gemiddelde spoed binne 1 uur 12 minute ry?

3. 'n Trein wat teen 'n gemiddelde spoed van 100 km/h ry, lê 'n bepaalde afstand binne 3 uur 36 minute af. Teen watter gemiddelde spoed moet die trein ry om dieselfde afstand binne 2 uur 30 minute af te lê?

Probleemoplossing


Skryf 'n probleem deur 'n voorbeeld oor spoed, afstand en tyd uit jou alledaagse lewe te gebruik. Vra 'n familielid om jou daarmee te help.

Teken:

Datum:

Direkte eweredigheid

Soos die een waarde verhoog (of verlaag), verhoog (of verlaag) die ander. Hoe dink jy sal dit op 'n grafiek lyk?



Terwyl jy besig is met hierdie werkblad, moet jy dink aan wat **aangekeerde eweredigheid** kan beteken. Ons bespreek dit op die volgende werkblad.



Los eweredigheidsprobleme met behulp van verskillende metodes op.

Voorbeeld: Die koste van 4 boeke is R150. Hoeveel kos 7 boeke dan?

Metode 1: Eenheidsmetode -

Bepaal die waarde van 1 ene en vermenigvuldig om die waarde van die verlangde aantal ene te bepaal

Boeke	Rand
4	R150
1	$\frac{R150}{4} = R37,50$
7	$7 \times R37,50 = R262,50$



Metode 2:

"Kruisvermenigvuldig"


Boeke	Rand
4	R150
7	x
$4 : 150 :: 7 : x$	
$(1^{ste} : 2^{de} :: 3^{de} : 4^{de})$	
$4 \times x = 7 \times R150$	
$(1^{ste} \times 4^{de} = 2^{de} \times 3^{de})$	
$\frac{4}{7}$	$\frac{R150}{x}$
$\frac{4x}{4}$	$\frac{R1\ 050}{4}$
$x = R262,50$	

Metode 3: Reël van drie

Stel terme in die regte kolomme op; vermenigvuldig 3^{de} term met 2^{de}; deel dan deur 1^{ste} term.

Boeke	Rand
4	R150
7	x
$4 : 150 :: 7 : x$	
$(1^{ste} : 2^{de} :: 3^{de} : 4^{de})$	
$x = 7 \times R150 \div 4$	
$(x = 3^{de} \times 2^{de} \div 1^{ste})$	
$x = \frac{7 \times 150}{4}$	
$x = R262,50$	

Trek 'n grafiek.




Hoe toon hierdie grafiek direkte eweredigheid?



1. Gebruik die 3 metodes om hierdie probleem op te los en 'n grafiek te trek. 5 T-hemde kos R120. Hoeveel sal 9 T-hemde kos?

Metode 1:	Metode 2:	Metode 3:

Trek 'n grafiek om dit te demonstreer.



Probleemoplossing

Waar sal jy direkte eweredigheid in jou alledaagse lewe gebruik? Demonstreer dit deur 'n grafiek daarvan te trek.





Teken:

Datum:

Omgekeerde eweredigheid

Soos een waarde toeneem, is daar 'n ooreenstemmende afname in die ander waarde.



1. Los die volgende op deur al die metodes te gebruik en trek 'n grafiek.

Voorbeeld: As 10 mense 4 dae lank aan 'n gat grawe, hoe lank sal 8 mans aan 'n gat grawe?

Metode 1: Unitêr

Bepaal die waarde van 1 ene en vermenigvuldig dit om die waarde van die verlangde aantal ene te kry.

Mans	Dae
10	neem 4
1	neem $10 \times 4 = 40$
8	neem $= 5 \frac{40}{8}$

Dit sal 8 mans 5 dae lank neem om 'n gat te grawe. Let wel: Minder mense het meer tyd nodig.

**Metode 2: Redenering**

Stel terme in die regte kolom op; vermenigvuldig die 1^{ste} term met die 2^{de} term, en die 3^{de} term met die 4^{de} term.

Mans	Dae
10	4
8	x
$10 : 8 = 4 : x$	
$10 : 4 = 8 : x$	
$(1^{\text{ste}} : 2^{\text{de}} = 3^{\text{de}} : 4^{\text{de}})$	
$10 \times 4 = 8 \times x$	
$(1^{\text{ste}} \times 2^{\text{de}} = 3^{\text{de}} \times 4^{\text{de}})$	
$40 = 8x$	
$\frac{8x}{8} = \frac{40}{8}$	
$x = 5$	

Metode 3: Reël van drie

Stel terme in die regte kolom op; vermenigvuldig die 1^{ste} term met die 2^{de} term en deel dan deur die 3^{de} term.

Mans	Dae
10	4
8	x
$10 : 8 = 4 : x$	
$(1^{\text{ste}} : 2^{\text{de}} = 3^{\text{de}} : 4^{\text{de}})$	
$x = 10 \times 4 \div 8$	
$(x = 1^{\text{ste}} \times 2^{\text{de}} \div 3^{\text{de}})$	
$x = \frac{10 \times 4}{8}$	
$x = 5$	

- a. As 3 vroue 21 T-hemde per dag maak, hoe lank sal dit 12 vroue dan neem?

Metode 1:	Metode 2:	Metode 3:

- b. Trek 'n grafiek.

- c. Hoe word omgekeerde eweredigheid op hierdie grafiek getoon?

Probleemoplossing

Waar sal jy omgekeerde eweredigheid in jou alledaagse lewe gebruik? Demonstreer dit op 'n grafiek.



Teken:

Datum:

Kan jy nog onthou wat 'n **begroting** is?

'n **Begroting** is die raming van koste en inkomste oor 'n gespesifiseerde tydperk.



Wat is **lenings** en **rente**?

'n **Lening** is die som geld wat 'n individu of 'n maatskappy aan 'n individu of maatskappy uitleen, met die doel om winste te maak sodra die geld terugbetaal word.

Rente is die fooi wat 'n uitlener vir 'n lener vra om die geleende geld te gebruik. Die rentekoers word gewoonlik uitgedruk as 'n jaarlikse persentasie van die bedrag wat geleen word (die hoofsom).

Weet jy wat die verskil is tussen **enkelvoudige** en **saamgestelde** rente?

Rente kan op twee maniere bereken word:

- **Enkelvoudige rente**

Die formule vir enkelvoudige rente is soos volg:

$$\frac{\text{Hoofsom} \times \text{rentekoers (\%)} \times \text{aantal tydperke}}{100}$$

- **Saamgestelde rente**

Saamgestelde rente beteken dat die rente die rentebedrag wat op die rente bereken word, insluit.

- Die formule vir die berekening van die **totale toekomstige bedrag** verskuldig is:

$$\text{Hoofbedrag} \times \left(1 + \frac{\text{Rentekoers (\%)}}{100}\right)^{\text{Aantal tydperke}}$$

Voorbeeld van saamgestelde rente

- 'n Bedrag van R100 word twee jaar lank belê teen rente van 10%, jaarliks saamgestel (toegevoeg).
- Die rente aan die einde van die eerste jaar is: $R100 \times 10\% = R10$.
- In die tweede jaar sal die rentekoers van 10% nie net op die R100 toegepas word nie, maar ook op die R10-rente van die eerste jaar.
- In die tweede jaar sal die rente dus $R110 \times 10\% = R11$ wees.
- Die totale rente wat oor die twee jaar verdien is, sal $R10$ (jaar 1) + $R11$ (jaar 2) = $R21$ wees.
- Die totale belegging ná twee jaar: $R100$ (hoofsom) + $R21$ (rente) = $R121$.
- Gebruik die formule: Totale toekomstige bedrag

$$\begin{aligned}
 &= R100 (1 + 0,10)^2 \\
 &= R100 (1,1)^2 \\
 &= R100 (1,21) \\
 &= R121
 \end{aligned}$$

1. Palesa moet R500 se rente verdien sodat sy genoeg het om 'n gebruikte fiets te koop. Sy plaas R2 000 in 'n rekening wat 5% enkelvoudige rente per jaar verdien. Hoe lank moet sy haar geld in die rekening hou voordat sy genoeg geld sal hê om die fiets te koop?

2. Thabo het R500 wat hy belê in 'n rekening wat 8% rente, jaarliks saamgestel, betaal. Hoeveel geld gaan Thabo aan die einde van drie jaar hê?

3. Susan het R1 000 wat sy belê in 'n rekening wat 8,5% rente, jaarliks saamgestel, betaal. Hoeveel geld gaan Susan aan die einde van vyf jaar hê?

4. Jy het laasjaar R4 750 gespaar. Jy besluit dat dit die beste sal wees om die geld te belê. Jou plaaslike bank bied twee beleggingsopsies: Opsie 1: 'n Vaste deposito van vyf jaar met 3,25% enkelvoudige rente per jaar. Opsie 2: 'n Vaste deposito van vyf jaar met 3,10% saamgestelde rente per jaar. Watter vyfjaarbelegging sal die beste opsie wees?

Probleemoplossing


Gestel dat jy graag R100 000 binne ses-en-dertig maande wil hê, wanneer jy van plan is om by 'n universiteit in te skryf. Jy wil in 'n plan belê wat 3,5% rente per jaar, maandeliks saamgestel, oplewer. Hoeveel moet jy dan belê?



Teken:

Datum:

Kan jy nog die betekenis van **huurkoop** onthou?



Huurkoop is 'n stelsel waarvolgens 'n koper in gereelde paaiemente vir 'n bate betaal, terwyl hy of sy die gebruik daarvan geniet.

Eienaarskap van die item gaan nie tydens die terugbetalingstydperk aan die koper oor nie. Sodra die lening ten volle terugbetaal is, word die titel aan die koper oorgedra.



Daar is baie organisasies wat huurkoop- of huurooreenkomste aangaan om oor 'n tydperk vir toerusting te betaal en dit dan te gebruik in plaas daarvan om die volle koste vooraf te betaal.


Die terugbetalingstydperk is gewoonlik dieselfde as die produksieleeftyd van die masjien. 'n Boer koop byvoorbeeld 'n trekker en betaal dit oor vyf jaar af. Ná vyf jaar moet hy tipies die trekker vervang.

1. Die huurkoopprys van 'n yskas is R6 500. 'n Deposito van R500 word gemaak, en die oorblywende bedrag word in gelyke maandelikse paaieimente van R250 betaal.
 - a. Bereken die aantal maandelikse paaieimente wat betaal moet word.
 - b. As die kontantprys R4 000 is, druk die ekstra koste om op huurkoop te koop, as 'n persentasie van die kontantprys uit.
 - c. Wat is die rentekoers (enkelvoudige rente) wat op hierdie transaksie gehef word?

[illegible]

Datum

Weet jy wat wisselkoers beteken?



Die **rand** (teken: R; kode: ZAR) is Suid-Afrika se geldeenheid.

In China gebruik mense deesdae **renminbi** as hul geld. In Chinees beteken renminbi "die mense se geld". 'n Ene van hierdie geldeenheid word die **yuan** genoem.

Die simbool vir die yuan lyk so: ¥ (kode: CNY)

Die **Kanadese dollar** (teken: \$; kode: CAD) is Kanada se geldeenheid.

Gebruik die wisselkoers in die tabel om jou te help om die woordsomme op te los. Wys jou bewerkinge in die ruimte wat voorsien word.

	ZAR (R)	USD (\$)	GBP (£)	CAD (\$)	EUR (€)	AUD (\$)
ZAR	1,00	6,76	11,06	6,89	9,88	7,17
USD	0,15	1,00	1,60	0,92	1,46	0,87
GBP	0,09	1,09	1,00	0,58	0,91	0,55
CAD	0,15	1,09	1,74	1,00	1,59	0,95
EUR	0,10	0,69	1,10	0,63	1,00	0,60
AUD	0,14	1,15	1,83	1,05	1,67	1,00

1. Suzanne wil graag 'n nuwe CD van Duitsland af bestel. Sy het R250 in haar spaarrekening. Die CD kos €5. Hoeveel geld sal sy in ZAR oorhê nadat sy die CD gekoop het?

As sy dieselfde CD vir \$7 van Kanada af bestel, vanwaar moet sy dit bestel as sy die beste prys daarvoor wil betaal, op voorwaarde dat die verskeppingskoste dieselfde is?

2. Reinette woon in Worcester, Suid-Afrika. Haar oom woon in Sydney, Australië. Reinette het \$50 van haar oom vir haar verjaarsdag ontvang. Hoeveel Suid-Afrikaanse rand (ZAR) kan sy met haar verjaarsdaggeld koop?

3. Reinette gebruik die geld wat sy by haar oom gekry het om 'n nuwe rekenaar-program van die Verenigde State van Amerika af te koop. Nadat sy die program gekoop het, het sy nog R150 oor. Hoeveel kos die program in VS dollar (\$)?

4. Reinette wil graag nog 'n program van Engeland af bestel. Die program kos £15. Sal Reinette nog genoeg geld hê om hierdie program te koop?

Probleemoplossing

Watter geldeenheid in die tabel het die hoogste gewaardeerde geldeenheid?

Teken:

Datum:

Weet jy wat kommissie beteken?
Wat is huurgeld?



Kommissie is die fooi wat 'n makelaar of 'n agent vir sy of haar diens vra om 'n transaksie soos die koop of verkoop van goedere te fasiliteer.

Huurgeld is die geld wat betaal word wanneer 'n item vir 'n spesifieke tydperk uitverhuur word.



Baie werknemers ontvang salarisse op grond van die aantal ure wat hulle oor 'n bepaalde tydperk gewerk het plus kommissie



1. André bly in Johannesburg. Sy ouers beplan om vir 'n vakansie Kaapstad toe te gaan. Hulle besluit om Kaapstad toe te vlieg en daar 'n motor te huur. Die motorverhurings maatskappy vra R200 per dag (insluitend 200 km gratis) en R1,80 per km. Die versekering beloop 7.5% van die daaglikse huurbedrag en om 'n GPS te huur, kos 'n bykomende R45 per dag.

Wat sal die totale koste vir die motor huur beloop as hulle ses dae lank in Kaapstad deurbring en altesaam 1 650 km aflê?

2. 'n Vragmotorverhuringsagentskap hef 'n daaglikse fooi plus 'n kilometerfooie. Julie moes R460 vir twee dae en 100 km betaal, terwyl Christina R1 050 vir drie dae en 400 km betaal het. Wat is die agentskap se daaglikse fooi en wat is die kilometerfooie?

3. Hertz vra 'n verwerkingsfooi van R115,00 en R210 per dag om 'n motor te verhuur. Avis Car Rental se verwerkingsfooi is R255,00 en hy vra R190 per dag om 'n motor te verhuur. Wanneer sal die koste van die twee maatskappye se huurgeld gelyk wees?

4. Tara is 'n verkoopsverteenwoordiger vir 'n kosmetiekmaatskappy. Sy word elke week R5,15 per uur betaal plus 'n kommissie van 10% op 'n verkoopsbedrag bo R5 000. Sy werk een week 40 uur en verkoop kosmetiek ter waarde van R7 260 vir daardie week. 'n Ander kosmetiekmaatskappy het haar 'n werk aangebied waar sy R5,00 per uur betaal sal word vir 'n veertiguur-werksweek plus 'n kommissie van 4% op haar totale verkope. Watter pos betaal meer? Moet sy van werk verander?

5. Twee meubelverkoopspersone staan en vergelyk hul salarisse. Gert word R25,00 per uur betaal plus 'n kommissie van 15% op sy totale verkope. Ben ontvang R29,00 per uur plus kommissie van 10% op sy totale verkope. Gestel dat elkeen meubels ter waarde van R5 000 verkoop het. Vergelyk hul inkomste oor verskillende tydperke om te bepaal wanneer hulle dieselfde gaan verdien. Wat sal daarna gebeur? Wie het voor daardie tydstip meer verdien?

Probleemoplossing

'n Eiendomsagent ontvang kommissie van 6% op die verkoopsprys van 'n huis. As sy kommissie R8 650 was, wat was dan die verkoopsprys van die huis?



Teken:

Datum:

Hersien: Gee 'n voorbeeld van elke eienskap. Skryf 'n formule vir elkeen neer.

Kommutatief

Assosiatief

Distributief

Nul as 'n eienskap van optelling

Een as 'n eienskap van vermenigvuldiging

1. Gebruik die kommutatiewe eienskap om aan te dui dat die vergelykings gelyk aan mekaar is.

Voorbeeld:

$$a + b = b + a$$

$$a^2 + b^2 = b^2 + a^2$$

$$a \times b^2 = b^2 \times a$$

$$2a + b = b + 2a$$

$$2a \times 2b = 2b \times 2a$$

Maar:

$$a \div b \neq b \div a$$

en

$$a - b \neq b - a$$

a. $y^2 + x =$

b. $3x + y^2 =$

c. $3x^2 + 5y^2 =$

d. $2x + y =$

e. $5y + x^2 =$

Toets albei kante van die vergelyking in a. tot e. as $x = 2$ en $y = -3$.

f.

g.

h.

$$\begin{array}{ll} y^2 + x & \text{en} \quad x + y^2 \\ = (-3)^2 + 2 & = 2 + (-3)^2 \\ = 9 + 2 & = 2 + 9 \\ = 11 & = 11 \end{array}$$

i.

j.

2. Gebruik die associatieve eienskap om aan te dui dat die vergelykings gelyk aan mekaar is.

Voorbeelde:

- $(a + b) + c = a + (b + c)$
- $(a^2 + b^2) + c^2 = a^2 + (b^2 + c^2)$
- $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
- $(a^2 \times b) \times c = a^2 \times (b \times c)$

Maar:

$$(a - b) - c \neq a - (b - c)$$

en

$$(a \div b) \div c \neq 1 \div (b \div c)$$

a. $(3m + n) + p^2 =$

b. $(n^2 + p^3) + 4m^2 =$

c. $(m \times p) \times n^3 =$

d. $(p^2 \times n^3) \times m^3 =$

e. $(n \times p^2) \times m^3 =$

Toets albei kante van die vergelykings in a. tot e. as $m = -4$ en $n = 6$.

f.

g.

h.

i.

j.

vervolg ➡



Teken:

Datum:

3. Gebruik die distributiewe eienskap om aan te dui dat die vergelykings gelyk aan mekaar is.

Voorbeelde: $a(b + c) = a \times b + a \times c$

$$a(b^2 + c^2) = a \times b^2 + a \times c^2$$

$$a(b - c) = a \times b - a \times c$$

$$a(b^2 - c^2) = a \times b^2 - a \times c^2$$

a. $(b^2 + c^3)d =$

b. $(d^2 \times b^3) + (d^2 \times c^3) =$

c. $d \times (c + b^2) =$

d. $c(b + d^2) =$

e. $(b^2 + d^2) \times c^3 =$

Toets nou beide kante van elke vergelyking in a. tot e.
as $b = 1$, $c = 3$ en $d = 4$ is.

f.

g.

h.

i.

j.

4. Gebruik die identiteitseienskap van optelling of vermenigvuldiging om die vergelykings waar te maak.

Voorbeeld:

$$a \text{ --- } = a$$

$$a + 0 = a$$

$$a \times 1 = a$$

a. $b \frac{\boxed{}}{\text{of}} = b$

$$b \frac{\boxed{}}{} = b$$

b. $c^2 \frac{\boxed{}}{\text{of}} = c^2$

$$c^2 \frac{\boxed{}}{} = c^2$$

c. $p^3 \frac{\boxed{}}{\text{of}} = p^3$

$$p^3 \frac{\boxed{}}{} = p^3$$

d. $m^3p^2 \frac{\boxed{}}{\text{of}} = m^3p^2$

$$m^3p^2 \frac{\boxed{}}{} = m^3p^2$$

e. $xx \frac{\boxed{}}{\text{of}} = x^2$

$$xx \frac{\boxed{}}{} = x^2$$

Probleemoplossing

Gebruik a , b en c , asook die distributiewe eienskap om 'n vergelyking op te stel en los dit op deur gebruik te maak van die volgende: $a = 2$, $b = 3$, $c = -1$.

Teken:

Datum:

Voordat jy met hierdie werkblad begin, moet jy seker maak jy weet wat die volgende beteken. Gee 'n voorbeeld van elkeen.

Faktore	GGD	Veelvoude	KGV	Onegte breuk na gemengde getal	Gemengde getal na onegte breuk	Om 'n breuk te vereenvoudig

1. Demonstreer hoekom hierdie breuke ekwivalent is.

Voorbeeld:

$$\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

Faktore van 3 = {1;3}

Faktore van 9 = {1;3;9}

GGF = 3

$$\therefore \frac{3}{9} \div \frac{3}{3} = \frac{1}{3}$$

GGF is die afkorting vir grootste gemeenskaplike faktor.



a. $\frac{4}{28} = \frac{1}{7}$

b. $\frac{24}{60} = \frac{2}{5}$

c. $\frac{25}{125} = \frac{1}{5}$

2. Bereken en vereenvoudig breuke wat veelvoude van mekaar is.

Voorbeeld:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} + \frac{3}{4} &= \frac{1}{2} \times \frac{2}{2} + \frac{3}{4} \\ &= \frac{2}{4} + \frac{3}{4} \text{ of } \frac{2+3}{4} \\ &= \frac{5}{4} \\ &= 1\frac{1}{4} \end{aligned}$$

Hoekom het ons $\frac{1}{2} \times \frac{2}{2}$ vermenigvuldig?

Kan ons breuke met verskillende noemers optel?

Ja, as ons die noemers dieselfde maak.



a. $\frac{2}{4} + \frac{7}{8} - \frac{1}{6} =$

b. $\frac{9}{10} - \frac{3-2}{5} + \frac{7}{8} =$

c. $\frac{2}{6} + \frac{5+1}{12} =$

$$d. \frac{8}{10} + \frac{2}{6} - \frac{9}{12} =$$

$$e. \frac{13}{15} - \frac{8}{10} + \frac{1}{5} =$$

$$f. \frac{3}{4} - \frac{5-3}{6} + \frac{7}{8} =$$

3. Bereken die volgende:

Voorbeeld:

$$2\frac{1}{5} + \frac{3}{6}$$

$$= \frac{11}{5} + \frac{3}{6}$$

Veelvoude van 5 = {5; 10; 15; 20; 25; 30; 35}

Veelvoude van 6 = {6; 12; 18; 24; 30; 36}

KGV = 30

$$= \frac{11}{5} \times \frac{30}{30} + \frac{3}{6} \times \frac{30}{30}$$

$$= \frac{11}{1} \times \frac{6}{30} + \frac{3}{1} \times \frac{5}{30}$$

$$= \frac{66}{30} + \frac{15}{30}$$

$$= 2\frac{21}{30} = 2\frac{7}{10}$$

KGV is die afkorting vir kleinste gemene veelvoud.



$$a. 3\frac{7}{10} - 1\frac{8}{9} =$$

$$b. -2\frac{2}{10} + 1\frac{6}{7} =$$

$$c. 8\frac{3}{4} - 6\frac{5}{6} + \frac{1}{2} =$$

$$d. 5\frac{4}{10} - 8\frac{4}{5} =$$

$$e. 3\frac{1}{2} + 2\frac{3}{9} + \frac{3}{8} =$$

$$f. 9\frac{7}{8} - 7\frac{3}{7} =$$

Probleemoplossing

As die antwoord op 'n som $\frac{3}{4}$ is, wat kan die som dan wees? Ontwikkel jou eie woordsomme soos dié.

Teken:

Datum:

Optelling en aftrekking van breuke wat vierkante, kubusse, vierkantswortels en derdemagswortels insluit

Voordat jy met hierdie werkblad begin, moet jy seker maak jy weet wat die volgende beteken. Gee 'n voorbeeld van elkeen.

Bereken 'n kwadraatgetal.

Bereken 'n vierkantswortel.

Bereken 'n derdemag.

Bereken 'n derdemagswortel.

1. Bereken die volgende breuke deur die voorbeelde as riglyn te gebruik.

Voorbeeld 1:

$$\frac{2^2}{2^3} + \frac{3^2}{4^2}$$

$$= \frac{4}{8} + \frac{9}{16}$$

$$= \frac{8}{16} + \frac{9}{16}$$

$$= \frac{17}{16}$$

$$= 1\frac{1}{16}$$

Voorbeeld 2:

$$-\frac{1^3}{3^2} - \frac{2^3}{4^2}$$

$$= -\frac{1}{9} - \frac{8}{16}$$

$$= -\frac{16}{144} - \frac{72}{144}$$

$$= -\frac{88}{144}$$

$$= -\frac{11}{8}$$

KGV: $3 \times 3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 144$

GGF = 8

$88 \div 8 = 11$

$144 \div 8 = 16$

9	3	16	2
3	3	2	2
1		2	2
		2	2

88	2	144	2
44	2	72	2
22	2	36	2
11	11	18	2
1		9	3
		3	3
		1	

GGV: $2 \times 2 \times 2 = 8$



Beskou voorbeeld 2: Hoekom is dit belangrik om KGV en GGF te verstaan wanneer ons breuke bereken?

a. $\frac{8^2}{8^3} - \frac{10^2}{10^3} =$

b. $\frac{2^2}{2^3} + \frac{7^2}{7^3} =$

c. $\frac{4^2}{4^3} + \frac{4^2}{4^3} =$

d. $\frac{5^2}{5^3} - \frac{3^2}{3^3} =$

e. $\frac{1^2}{1^3} - \frac{9^2}{9^3} + \frac{11^2}{11^3} =$

f. $\frac{4^2}{4^3} + \frac{15^2}{15^3} =$

2. Bereken die volgende:

Voorbeeld: $\frac{\sqrt{9}}{\sqrt{16}} + \frac{\sqrt[3]{8}}{\sqrt[3]{27}}$

$$= \frac{3}{4} + \frac{2}{3}$$
$$= \frac{9}{12} + \frac{8}{12} \text{ of } \frac{9+8}{12}$$
$$= \frac{17}{12}$$
$$= 1\frac{5}{12}$$

a. $\frac{\sqrt{25}}{\sqrt{100}} + \frac{\sqrt[3]{1\,331}}{\sqrt[3]{144}} =$

b. $\frac{\sqrt{36}}{\sqrt{1000}} - \frac{\sqrt[3]{64}}{\sqrt{25}} =$

c. $\frac{\sqrt{1}}{9} + \frac{\sqrt[3]{8}}{\sqrt{16}} =$

d. $\frac{\sqrt{1}}{\sqrt[3]{1000}} - \frac{\sqrt[3]{64}}{\sqrt{25}} =$

e. $\frac{\sqrt[3]{1\,331}}{\sqrt[3]{8}} + \frac{\sqrt{169}}{\sqrt{144}} =$

f. $\frac{\sqrt{81}}{\sqrt[3]{1000}} - \frac{\sqrt[3]{27}}{\sqrt{64}} =$

Probleemoplossing

Ontwikkel jou eie woordsomme deur derdemagte en derdemagswortels te gebruik.

Teken:

Datum:

Wat is die resiprook van 'n getal?

Om die resiprook van 'n getal te kry, deel 1 deur die getal.

Die resiprook van 2 is $\frac{1}{2}$

As jy 'n getal met sy resiprook vermenigvuldig, kry jy 1.

... byvoorbeeld $3 \times \frac{1}{3} = 1$

Het jy geweet dat elke getal, behalwe 0, 'n resiprook het?

... want $\frac{1}{0}$ is ongedefinieer.

Dit word ook die vermenigvuldigingsinvers of omgekeerde genoem.

1. Bereken en vereenvoudig.

Voorbeeld:

$$\begin{aligned} 6 \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{6}{1} \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{6}{2} \\ &= 3 \end{aligned}$$

a. $8 \times \frac{1}{2} =$

b. $9 \times \frac{1}{3} =$

c. $7 \times \frac{1}{14} =$

d. $5 \times \frac{2}{15} =$

e. $4 \times \frac{2}{12} =$

f. $9 \times \frac{1}{27} =$

2. Vereenvoudig:

Jy kan vereenvoudig deur die grootste gemeenskaplike faktore (GGF) te bepaal – as jy die GGF aanvanklik nie kan bepaal nie, hou aan om te vereenvoudig met kleiner gemeenskaplike faktore.

Voorbeeld:

$$\frac{4}{8} \times \frac{7}{6}$$

$$\frac{4 \times 7}{8 \times 6} = \frac{28}{48}$$

Vereenvoudig, indien nodig:

$$\frac{28}{48} \div \frac{4}{4}$$

$$= \frac{7}{12}$$

Hoe het ek geweet om te vereenvoudig deur te deel deur 4?

Faktore van 28 = {1; 2; 4; 7; 14; 28}

Faktore van 48 = {1; 2; 4; 6; 8; 12; 16; 24; 48} of

48	2	28	2
24	2	14	2
12	2	7	7
6	2	1	
3	3		
1			

$$48 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$$

$$28 = 2 \times 2 \times 7$$

$$\text{GGF} = 2 \times 2 = 4$$

a. $\frac{1}{6} \times \frac{2}{4} =$

b. $\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} =$

c. $\frac{2}{7} \times \frac{1}{2} =$

3. Vereenvoudig:

Voorbeeld:

$$\begin{aligned} -\frac{8}{9} \times \frac{7}{10} &= -\frac{8}{9} \times \frac{7}{10} \\ &= -\frac{28}{45} \end{aligned} \quad \text{of} \quad \begin{aligned} -\frac{8 \times 7}{9 \times 10} &= -\frac{56}{90} \\ &= -\frac{56}{90} \div \frac{2}{2} \\ &= -\frac{28}{45} \end{aligned}$$

90	2	56	2
45	5	28	2
9	3	14	2
3	3	7	7
1		1	

$$\begin{aligned} 90 &= 2 \times 5 \times 3 \times 3 \\ 56 &= 2 \times 2 \times 2 \times 7 \end{aligned}$$

GGF = 2

a. $\frac{2}{10} \times \frac{6}{8} =$

b. $\frac{2}{6} \times -\frac{3}{7} =$

c. $\frac{4}{8} \times \frac{2}{2} =$

vervolg ➡



Teken:

Datum:

Vermenigvuldiging van gewone breuke vervolg

4. Vereenvoudig:

Voorbeeld:

$$\begin{aligned} \frac{12}{14} \times \frac{7}{8} &= \frac{12}{14} \times \frac{7}{8} \\ &= \frac{3 \times 1}{2 \times 2} \quad \text{of} \quad \frac{12 \times 7}{14 \times 8} \\ &= \frac{3}{4} \quad \quad \quad \frac{84 \div 24}{112 \div 24} \\ &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

Vereenvoudig DEUR die grootste gemeenskaplike faktore (GGF) te bepaal. As jy die GGF aanvanklik nie kan bepaal nie, hou aan om te vereenvoudig, deur met kleiner gemeenskaplike faktore te deel.



112	2	84	2
56	2	42	2
28	2	21	7
14	2	3	3
7	7	1	
1			

$$\begin{aligned} &2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 7 \\ &2 \times 2 \times 3 \times 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{KGV} &= 28 \\ \text{GGF} &= 7 \end{aligned}$$

a. $\frac{3}{4} \times \frac{4}{7} =$

b. $\frac{2}{9} \times \frac{3}{10} =$

c. $\frac{4}{8} \times \frac{1}{6} =$

5. Vereenvoudig en skryf jou antwoorde as gemengde getalle (gebruik 'n sakrekenaar, indien nodig):

Voorbeeld:

HERSIENING

$$\begin{aligned} 4 \frac{5}{6} \times 3 \frac{2}{3} &= \frac{29}{6} \times \frac{11}{3} \\ &= \frac{29 \times 11}{6 \times 3} \\ &= \frac{319}{18} \\ &= 17 \frac{13}{18} \end{aligned}$$

Om gemengde getalle tot onegte breuke te herlei:

$4 \frac{5}{6}$ (vermenigvuldig 4 met 6 en tel 5 = $\frac{26}{6}$ daarby om die teller te kry).

$3 \frac{2}{3}$ (vermenigvuldig 3 met 3 [noemer] en tel 2 daarby om die teller = $\frac{11}{3}$ te kry).

Om 'n onegte breuk na 'n gemengde getal te verander:

$\frac{319}{18}$ (vra hoeveel keer 18 in 319 ingaan ($319 \div 18 = 17$ res 13)) = $17 \frac{13}{18}$.

Gebruik 'n sakrekenaar indien nodig.

a. $2\frac{1}{3} \times 1\frac{1}{4} =$

b. $\frac{1}{2} \times 2 =$

c. $3\frac{4}{5} \times 4\frac{2}{20} =$

6. Vereenvoudig:

Voorbeeld:

$$\begin{aligned} & -5\frac{1}{2} \times \frac{4}{10} \\ &= -\frac{11}{2} \times \frac{4}{10} \\ &= -\frac{11 \times 4}{2 \times 10} \\ &= -\frac{44}{20} \\ &= -2\frac{4}{20} \end{aligned}$$

Vereenvoudig = $-2\frac{1}{5}$

HERSIENING

Kan jy nog onthou?

('n Positiewe getal) $\times$ ('n positiewe getal) = 'n positiewe getal.

('n Positiewe getal) $\times$ ('n negatiewe getal) = 'n negatiewe getal.

('n Negatiewe getal) $\times$ ('n negatiewe getal) = 'n positiewe getal.

a. $\frac{8}{9} \times -\frac{3}{4} =$

b. $-3\frac{3}{8} \times \frac{1}{2} =$

c. $-\frac{1}{4} \times -1\frac{1}{4} =$

Probleemoplossing

'n Trein met nege passasierswaens is onderweg, en elke passasierswa het sitplek vir 30. As hierdie passasierswaens vervang sou word deur waens wat die helfte meer sitplekke het, hoeveel waens het die trein dan nodig om dieselfde aantal passasiers te vervoer?



Teken:

Datum:

Hersiening: Wat beteken resiprook?

Getal

Resiprook

8

 $\frac{1}{8}$

Vergelyk dit as jy $\frac{3}{4}$ en $\frac{1}{4}$ deel en vermenigvuldig.

Vermenigvuldig

$$\frac{3}{4} \times \frac{1}{4}$$

$$=$$

Deel

$$\frac{3}{4} \div \frac{1}{4}$$

$$=$$

Wat merk jy op?

1. Vereenvoudig:

Voorbeeld:

$$\begin{aligned} & \frac{7}{9} \div \frac{4}{12} \\ &= \frac{7}{9} \times \frac{12}{4} \\ &= \frac{28}{12} \\ &= \frac{14}{6} \\ &= 2 \frac{2}{6} \\ &= 2 \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Hoe deel ek 'n breuk deur 'n ander breuk?

- Draai die tweede breuk onderstebo (dit is nou daardie breuk se resiprook).
- Vermenigvuldig die eerste breuk met daardie resiprook.
- Vereenvoudig die breuk, indien nodig.



a. $\frac{8}{10} \div 3 =$

b. $\frac{2}{6} + \left(-\frac{8}{12}\right) =$

c. $\frac{1}{4} \div 1 \frac{1}{12} =$

2. Vereenvoudig:

Voorbeeld:

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{9} \div 3 \frac{1}{10} \\ &= -\frac{1}{9} \div \frac{31}{10} \\ &= -\frac{1}{9} \times \frac{10}{31} \\ &= -\frac{10}{279} \end{aligned}$$

Is dit moontlik om hierdie uitdrukking te vereenvoudig?

$$-9\frac{1}{3} \div 8\frac{3}{4} =$$

a. $-3\frac{1}{16} \div 1\frac{1}{8} =$

b. $-7\frac{2}{5} \div 5\frac{1}{10} =$

c. $-9\frac{1}{3} \div \left(8\frac{3}{4}\right) =$

3. Vereenvoudig:

Voorbeeld:

$$\begin{aligned} & 4\frac{1}{16} \div \frac{2}{4} \\ &= \frac{65}{16} \times \frac{4}{2} \\ &= \frac{65}{8} \\ &= 8\frac{1}{8} \end{aligned}$$

a. $2\frac{1}{4} \div 2 =$

b. $4\frac{3}{4} \div 2\frac{2}{3} =$

c. $\frac{7}{4} \div \frac{1}{4} =$

Probleemoplossing

Vra een van jou familielede of hulle weet hoe om breuke te deel. As hulle nie weet nie of nie kan onthou nie, wys dan vir hulle hoe om dit te doen.

Teken:

Datum:

Wat is 20 % van R140?

$$\begin{aligned}
 & 20 \% \times R140 \\
 &= \frac{20}{100} \times R140 \\
 &= \frac{20}{100} \times \frac{R140}{1} \\
 &= \frac{R2\ 800}{100} \\
 &= R28
 \end{aligned}$$

Wat beteken "van" in wiskunde?

Wat beteken 20%?

Hoe kan ek R140 as 'n breuk skryf?

Hoekom kan ek ook $0,2 \times R140 = R28$ sê?



1. Bereken die volgende:

a. Wat is 10 % van R1 000?

b. Wat is 20 % van R250?

c. Wat is 15 % van R600?

2. Bereken die volgende:

Voorbeeld: Watter persentasie is R1,40 van R10,00?

$$\begin{aligned} & \frac{R1,40}{R10,00} \text{ van } 100 \% \\ &= \frac{R1,40}{10} \times \frac{100}{1} \% \\ &= 14 \% \end{aligned}$$

Die woordjie "van"
sê my dat dit 'n
vermenigvuldigingsom is.

a. Watter persentasie is R10,00 van R200?

b. Watter persentasie is 20c van R1,95?

vervolg



Teken:

Datum:

3. Bereken hierdie persentasiestygings. Rond jou antwoorde af tot die naaste honderdste.

Voorbeeld: Bereken die persentasiestyging in die prys van petrol as dit van R9,15 per liter tot R9,50 per liter verhoog word.

$$R9,50 - R9,15 = R0,35$$

$$\frac{0,35}{9,15} \times 100 \%$$

$$= \frac{35}{915} \%$$

$$= 3,83 \%$$

Voordat jy a. en b. beantwoord, verduidelik eers hierdie voorbeeld in jou eie woorde.



- a. Bereken die persentasiestyging in die prys van 'n rekenaarspeletjie as dit van R450,00 tot R699,00 verhoog.

- b. Bereken die persentasiestyging in die prys van melk as dit van R8,50 per liter tot R9,25 per liter styg.

4. Bereken hierdie persentasiedalings. Rond jou antwoorde af tot die naaste honderdste.

Voorbeeld: Bereken die persentasiedaling in die prys van koring as dit van R1 280 per ton tot R1 275 per ton daal.

$$R1\ 280 - R1\ 275 = R5$$

$$\frac{5}{1\ 280} \times \frac{100}{1} \%$$
$$= \frac{500}{1\ 280} \%$$

$$= 0,39 \%$$

Voordat jy a. en b. beantwoord, verduidelik eers hierdie voorbeeld in jou eie woorde.



- a. Bereken die persentasiedaling in die prys van 'n skootrekenaar as dit van R4 599 tot R4 299 daal.

- b. Koffie word teen 'n spesiale prys in die supermark te koop aangebied. Die prys daal van R52,99 per blik tot R38,99 per blik. Wat was die persentasiedaling in die prys?

Probleemoplossing

Vind uit wat die jongste styging of daling in petrol is. Bereken die persentasiestyging of -daling. Hoekom dink jy styg of daal die prys van petrol gereeld?

Teken:

Datum:

Gewone breuke, desimale breuke en persentasies

Wat het jy nodig om die volgende getalle te vermenigvuldig sodat dit by 100 uitkom? Hoe vinnig kan jy dit doen?

2	4	5	8	10	20	25	70
$\times 50 = 100$							

1. Skryf hierdie breuke as persentasies.

Voorbeeld 1:

$$\begin{aligned} & \frac{2}{5} \\ &= \frac{2}{5} \times \frac{20}{20} \\ &= \frac{40}{100} \\ &= 0,4 \\ &= 40\% \end{aligned}$$


Ons kan 5 met 20 vermenigvuldig om 100 te kry, dus vermenigvuldig jy die bokant en die onderkant met 20.

Voorbeeld 2:


$$\begin{aligned} & \frac{6}{8} \\ &= \frac{6}{8} \times \frac{125}{125} \\ &= \frac{750}{1000} \\ &= 0,75 \\ &= 75\% \end{aligned}$$

Ons kan 8 met 125 vermenigvuldig om 1 000 te kry, dus vermenigvuldig jy die bokant en die onderkant met 125. Hoekom het ons die noemer 1 000 gemaak?

$$\text{Let wel: } = \frac{40}{100} = 0,4 = 40\%$$



$$\text{Let wel: } = \frac{75}{100} = 0,75 = 75\%$$



a. $\frac{3}{4}$

b. $\frac{2}{3}$

c. $\frac{6}{7}$

d. $\frac{1}{2}$

e. $\frac{5}{7}$

f. $\frac{1}{8}$

Voorbeeld 3: Daar is nog 'n metode waarvolgens jy 'n breuk tot 'n persentasie kan herlei. Dit is veral nuttig as die noemer nie maklik met 'n getal vermenigvuldig kan word om 100 of 1 000 te kry nie.

$$\frac{5}{23}$$

$$\begin{aligned} & \frac{5}{23} \times 100 \% \\ &= \frac{500}{23} \% \\ &= 21,74 \% \end{aligned}$$

5 0 0 ÷ 2 3

Gebruik 'n sakrekenaar hiervoor.

g. $\frac{4}{8}$

h. $\frac{5}{25}$

i. $\frac{15}{15}$

j. $\frac{18}{20}$

k. $\frac{3}{9}$

l. $\frac{4}{36}$

2. Skryf die volgende as 'n persentasie en as 'n gewone breuk. (Hersiening)

a. 0,6

b. 0,25

c. 0,75

d. 0,1

e. 0,530

f. 0,36

3. Skryf die volgende as 'n persentasie en as 'n gewone breuk. (Hersiening)

a. 0,325

b. 0,205

c. 0,723

d. 0,825

e. 0,125

f. 0,065

Probleemoplossing

Skryf 35,4% as 'n gewone breuk en as 'n desimale breuk.

Teken:

Datum:

Optelling, aftrekking en afronding van desimale breuke


Hersien:

Rond 4,6 af tot die naaste ene. Rond dit af tot 5.




Wat is 4,4, afgerond tot die naaste ene?

Rond 2,73 af tot die naaste tiende. Rond af tot 2,7.



Wat is 2,76, afgerond tot die naaste tiende?

Rond 8,469 af tot die naaste honderdste. Rond af tot 8,47.



Wat is 8,469 afgerond tot die naaste honderdste?

1. Rond af tot die naaste ene, tiende en honderdste.

Voorbeeld:

Rond af 5,9 tot die naaste ene: 6

Rond af 5,91 tot die naaste tiende: 5,9

Rond af 5,905 tot die naaste honderdste: 5,91

a. 0,75

Ene:
Tiende:
Honderdste:

b. 0,123

Ene:
Tiende:
Honderdste:

c. 0,825

Ene:
Tiende:
Honderdste:

d. 0,795

Ene:
Tiende:
Honderdste:

e. 0,952

Ene:
Tiende:
Honderdste:

f. 0,468

Ene:
Tiende:
Honderdste:

2. Bereken die volgende deur uitgebreide notasie en dan die kolom-metode te gebruik. Toets daarna jou antwoord. Rond jou antwoord af tot die naaste ene, tiende en honderdste.

Voorbeeld: Uitgebreide notasie:

$$\begin{aligned} & 3,765 + 2,143 \\ & = 3 + 2 + 0,7 + 0,1 + 0,06 + 0,04 + 0,005 + 0,003 \\ & = 5 + 0,8 + 0,1 + 0,008 \\ & = 5,908 \end{aligned}$$

Kolom-metode:

$$\begin{array}{r} 3,765 \\ + 2,143 \\ \hline 5,908 \end{array}$$

Toets jou antwoord:

$$\begin{array}{r} 5,908 \\ - 2,143 \\ \hline 3,765 \end{array}$$

3,765 afgerond tot die naaste:

Ene: 4

Tiende: 3,8

Honderdste: 3,77

a. $2,354 + 7,265 =$

Gebruik jou eie papier indien nodig.

Uitgebreide notasie	Kolom-metode	Toetsing	Afgerond tot die naaste: Ene: Tiende: Honderdste:

b. $2,686 + 1,325 =$

Uitgebreide notasie	Kolom-metode	Toetsing	Afgerond tot die naaste: Ene: Tiende: Honderdste:

c. $8,940 - 2,355 =$

Uitgebreide notasie	Kolom-metode	Toetsing	Afgerond tot die naaste: Ene: Tiende: Honderdste:

d. $6,725 - 4,025 =$

Uitgebreide notasie	Kolom-metode	Toetsing	Afgerond tot die naaste: Ene: Tiende: Honderdste:

Probleemoplossing

Hoekom rond ons af? Soek na tien voorbeelde in die werklike lewe waar ons desimale breuke in ons daaglikse lewe moet afrond.

Teken:

Datum:

Hoe vinnig kan jy die volgende vermenigvuldig of deel?

$2 \times 0,3$ =	$0,2 \times 0,3$ =	$0,2 \times 0,03$ =	$0,02 \times 0,03$ =	$0,002 \times 0,03$ =	$0,002 \times 0,003$ =
$1\ 000 \div 5$ =	$100 \div 5$ =	$10 \div 5$ =	$0,1 \div 5$ =	$0,01 \div 5$ =	$0,001 \div 5$ =

1. Bereken die volgende:

Voorbeeld: $(6 + 0,3) \times (7 + 0,5)$
 $= (6 + 0,3) \times 7 + (6 + 0,3) \times 0,5$
 $= 6 \times 7 + 0,3 \times 7 + 6 \times 0,5 + 0,3 \times 0,5$
 $= 42 + 2,1 + 3,0 + 0,15$
 $= 47,25$

a. $(3,5 + 4,3) \times (1,2 - 0,9) =$

b. $1,2 \times (1,3 + 8,6) =$

c. $(8,2 - 6,4) \times (5,8 - 6,2) =$

2. Bereken die volgende:

Voorbeeld: $7,3 \times 8,4$

$$\begin{array}{r} 8,4 \\ \times 7,3 \\ \hline 2,52 \\ + 58,80 \\ \hline 61,32 \end{array}$$

a. $6,2 \times 3,8 =$

b. $2,6 \times 4,9 =$

c. $9,5 \times 3,9 =$

3. Bereken die volgende:

Voorbeeld: $8 \overline{)13,6}$
 $\underline{8} $
 56
 $\underline{56}$
 0

a. $7 \overline{)12,6} =$

b. $9 \overline{)29,7} =$

c. $6 \overline{)52,8} =$

4. Bereken die volgende (kontroleer jou antwoord met 'n sakrekenaar):

Voorbeeld 1: $2,576 \div 0,28$

$$\begin{array}{r} 2,576 \div 28 \\ = \frac{2576}{1000} \div \frac{28}{100} \\ = \frac{2576}{1000} \times \frac{100}{28} \\ = \frac{2576}{10} \div 7 \\ = \frac{280}{10} \div 7 \\ = \frac{368}{10} \div 4 \\ = \frac{92}{10} \\ = 9,2 \end{array}$$

Voorbeeld 2: $3,150 \div 0,24$

$$\begin{array}{r} 3,150 \div 24 \\ = \frac{3150}{1000} \div \frac{24}{100} \\ = \frac{3150}{1000} \times \frac{100}{24} \\ = \frac{3150}{10} \div 24 \\ = \frac{240}{10} \div 24 \\ = \frac{1575}{120} \div 4 \\ = \frac{120}{315} \div 4 \\ = \frac{24}{120} \\ = 13,125 \end{array}$$

a. $1,715 \div 0,35 =$

b. $2,756 \div 0,32 =$

Probleemoplossing

Kies een som uit vraag 1, 2, 3, of 4. Skryf 'n woordsom vir elkeen.

Bereken vierkante, vierkantswortels, kubusse en derdemagswortels

Kan jy 'n wetenskaplike sakrekenaar gebruik om eksponente soos 3^5 te bereken?

Druk

Druk

Druk

Druk

Wat beteken $\wedge$ wanneer jy eksponente skryf?

Die teken $\wedge$ beteken "verhef tot die mag van".

Dus is 3^5 dieselfde as $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$.

Wat beteken $\wedge$ wanneer jy eksponente skryf?

1. Skat hierdie vierkante en bereken dit dan met 'n sakrekenaar.

Voorbeeld: As $5^2 = 25$ wat is $5,5^2$?

Skatting

- $5^2 = 25$ dan moet $5,5^2$ groter wees as 25. Hoekom?
- $6^2 = 36$ dan moet $5,5^2$ kleiner wees as 36. Hoekom?

Sakrekenaar

Druk

Druk

Druk

Druk

= 30,25

Bereken

$5,5^2$

= $5,5 \times 5,5$

Maak gebruik van die distributiewe eienskap.

$$(5 + 0,5) [5 + 0,5]$$

$$= 25 + 2,5 + 2,5 + 0,25$$

$$= 30,25$$

Op sommige sakrekenaars hoef jy nie die =-knoppie te druk nie.

Let op dat verskillende sakrekenaars (wat maak en model betref) verskillende stappe kan verlang.

a. As $3^2 = 9$, wat is $3,5^2$?

b. As $4^2 = 16$, wat is $4,5^2$?

c. As $9^2 = 81$, wat is $9,5^2$?

d. As $6^2 = 36$, wat is $6,5^2$?

e. Doen elke stap weer en wys al die stappe van jou berekening. (Jy kan dit op 'n aparte vel papier doen.)

2. Skat hierdie kubusse en bereken dit dan met 'n sakrekenaar.

Voorbeeld: As $4^3 = 64$ wat is $4,5^3$?

Skat

$$4^3 = 64$$

$$5^3 = 125$$

Die antwoord moet dus tussen 64 en 125 wees.

Sakrekenaar

Druk

Druk

Druk

Druk

= 90,125

Bereken

$$(4,5) [(4,5) (4,5)]$$

$$= [(4 + 0,5) (4 + 0,5)] [(4,5)]$$

$$= (16 + 2 + 2 + 0,25) [(4,5)]$$

$$= (20,25) [(4,5)]$$

$$= (20 + 0,25) [(4 + 0,5)]$$

$$= 80 + 10 + 1 + 0,125$$

$$= 90,125$$

a. As $2^3 = 8$, wat is $2,5^3$?

b. As $8^3 = 512$, wat is $8,5^3$?

c. As $1^3 = 1$, wat is $1,5^3$?

d. Doen elke stap weer en wys al die stappe van jou berekening.

Bereken vierkante, vierkantswortels, kubusse en derdemagswortels vervolg

3. Skat hierdie vierkantswortels en bereken dit dan met 'n sakrekenaar. Toon dan al die stappe van jou berekening.

Voorbeeld: As $\sqrt{16} = 4$ wat is $\sqrt{18}$?

Skat

$$\sqrt{16} = 4$$

$$\sqrt{25} = 5$$

Dus moet $\sqrt{18}$ tussen 4 en 5 wees.

Sakrekenaar

Druk

Druk

Druk

= 4,24 (4,2426406871193)

Let op dat verskillende sakrekenaars (wat maak en model betref) verskillende stappe kan verlang.

a. As $\sqrt{9} = 3$ wat is $\sqrt{12}$?

b. As $\sqrt{36} = 6$ wat is $\sqrt{42}$?

c. As $\sqrt{16} = 4$ wat is $\sqrt{20}$?

4. Skat hierdie derdemagswortels en bereken dit dan met 'n sakrekenaar. Toon dan al die stappe van jou berekening.

Voorbeeld: As $\sqrt[3]{27} = 3$ wat is $\sqrt[3]{50}$?

Skat

$$\sqrt[3]{27} = 3$$

$$\sqrt[3]{64} = 4$$

Dus moet $\sqrt[3]{50}$ tussen 3 en 4 wees.

Sakrekenaar

Druk

Druk

Druk

Druk

= 3,68 (3,684031499)

Druk

Druk

of

Druk

= 3,68

Probleemoplossing

Gee die stappe wat jy vir vraag 1. a. tot c. neergeskryf het vir 'n maat om deur te gaan en te kontroleer.

Bereken nog vierkante, vierkantswortels, kubusse en derdemagswortels

Jy moet die volgende ken en hersien:

Hoe om vierkantswortels te bereken deur 'n sakrekenaar te gebruik.

Hoe om 'n desimaal tot die naaste ene, tiende of honderdste af te rond (deur die getallelyne hierna te gebruik). Gee 'n voorbeeld van elk.

--

Ene																			
Tiende																			
Honderdste																			

1. Bereken en rond af tot die naaste ene, tiende en honderdste.

Voorbeeld:	Ene	tiende	honderdste
$\sqrt{6} + \sqrt{12}$ $= 2,449 + 3,464$ $= 5,913$	6	5,9	5,91

$$a. \sqrt{17} + \sqrt{24} =$$

--

$$b. \sqrt[3]{65} + \sqrt[3]{730} =$$

--

$$c. \sqrt{48} + \sqrt[3]{430} =$$

--

2. Bereken en rond af tot die naaste ene, tiende en honderdste.

Voorbeeld:	Ene	tiende	honderdste
$2,5^2 + 2,5^3$ $= 6,25 + 15,625$ $= 21,875$	22	21,9	21,88

$$a. 2,9^2 + 1,4^3 =$$

--

$$b. 1,3^3 + 11^2 =$$

--

$$c. 1,2^2 + 8^2 =$$

--

3. Bereken en rond af tot die naaste ene, tiende en honderdste.

Voorbeeld:	Ene	tiende	honderdste
$(\sqrt{6}) (\sqrt{12})$ $= (2,449) (3,464)$ $= 8,483$	8	8,5	8,48

Let op dat $\sqrt{14} \cdot \sqrt{19}$ dieselfde is as $(\sqrt{14})(\sqrt{19})$

$$a. (\sqrt{13})(\sqrt{7})$$

--

$$b. (\sqrt{5})(\sqrt{8})$$

--

$$c. (\sqrt{14})(\sqrt{19})$$

--

4. Bereken en rond af tot die naaste ene, tiende en honderdste.

Voorbeeld:	Ene	tiende	honderdste
$(2,5^2)(2,5^3)$ $= 6,25 \times 15,625$ $= 97,656$	98	97,7	97,66

$$a. (3,5)^2 (3,5)$$

--

$$b. (1,9)^2 (1,9)^2$$

--

$$c. (11,2)^3 (11,2)^2$$

--

$$d. (6,7)^2 (6,7)^3$$

--

$$e. (4,8)^2 (4,8)^3$$

--

--

5. Bereken en rond af tot die naaste ene, tiende en honderdste.

Voorbeeld:	Ene	tiende	honderdste
$\sqrt{6} + (\sqrt{12} + \sqrt{20})$ $= 2,449 + 3,464 + 4,472$ $= 10,385$	10	10,4	10,39
$\sqrt{6} + (\sqrt{12} + \sqrt[3]{9})$ $= 2,449 + 3,464 + 2,08$ $= 7,993$	8	8,0	7,99

$$a. \sqrt{79} - (\sqrt{13} + \sqrt{59})$$

--

$$b. \sqrt[3]{18} - (\sqrt[3]{500} - \sqrt[3]{210})$$

--

$$c. \sqrt[3]{34} - (\sqrt[3]{709} - \sqrt[3]{200})$$

--

Bereken nog vierkante, vierkantswortels, kubusse en derdemagswortels vervolg

6. Bereken en rond af tot die naaste ene, tiende en honderdste.

Voorbeeld: $2,5^2 (1,5^2 + 1,2^2)$
 $= (2,5^2 \times 1,5^2) + (2,5^2 \times 1,2^2)$
 $= (6,25 \times 2,25) + (6,25 \times 1,44)$
 $= 14,062 + 9$
 $= 23,162$

Ene	tiende	honderdste
23	23,3	23,26

a. $3,2^2 (11,6^2 + 7,8^3)$

b. $4,4^3 (2,8^3 + 3,1^2)$

c. $8,1^3 (3,9^3 + 7,4^3)$

d. $11,2^2 (4,2^3 + 5,6^2)$

e. $9,6^2 (8,2^3 + 10,3^2)$

7. Bereken en rond af tot die naaste ene, tiende en honderdste.

Voorbeeld: $\sqrt{6} (\sqrt{12} + \sqrt{20})$
 $= (\sqrt{6} \times \sqrt{12}) + (\sqrt{6} \times \sqrt{20})$
 $\approx (2,449 \times 3,464) + (2,449 \times 4,472)$
 $= 8,483 + 10,952$
 $= 19,435$

Ene	tiende	honderdste
19	19,4	19,44

a. $\sqrt{26} (\sqrt[3]{15} + \sqrt[3]{629})$

b. $\sqrt{21} (\sqrt[3]{162} + \sqrt[3]{164})$

c. $\sqrt{325} (\sqrt[3]{1000} + \sqrt[3]{137})$

Probleemoplossing

Kies enige som wat in hierdie les gedoen is en maak 'n woordsom daarvan. Let op dat jy sorgvuldig hieroor sal moet nadink.

Jy moet die volgende hersien:

Kan jy onthou wat wetenskaplike notasie is?

$$7842.5 = 7.8425 \times 10^3$$

Tien tot drie mag van



Hoe word 4.5×10^3 as 'n getal geskryf?

$$4.5 \times 1 = 4.5$$



$$7842.5 = 7.8425 \times 1\,000 = 7.8425 \times 10^3$$

1. Hersiening: Vergelyk die twee getalle.

Voorbeeld:

$$(-2)^2 = (-2)(-2) = 4$$

$$-(2)^2 = -(2)(2) = -4$$

a. $-(4)^2$; $(-4)^2$

b. $-(6)^3$; $(-6)^3$

c. $(-3)^3$; $-(3)^3$

d. $(-8)^3$; $-(8)^3$

e. $(-6)^2$; $-(6)^2$

f. $(-4)^3$; $-(4)^3$

2. Hersiening : Voltooi $<$, $>$ of $=$ in.

Voorbeeld 1:

$$(-2)^2 > -(2)^2$$

$$(-3)^2 > -(3)^2$$

$$(-2)^3 = -(2)^3$$

a. $-(10)^2$ $(-10)^2$

b. $-(6)$ $(-6)^3$

c. $(-9)^3$ $-(9)^3$

d. $(-8)^3$ $(8)^3$

e. $(-6)^2$ $-(6)^2$

f. $(-4)^3$ $-(4)^3$

3. Skakel 'n gewone getal om na wetenskaplike notasie of skakel die wetenskaplike notasie om na 'n gewone getal.

Voorbeeld: $8\,740\,000 = 8.74 \times 10^6 = 8\,740\,000$

a. 256 000

b. 790 000 000

c. 5×10^{-6}

d. 8.1×10^6

e. 0,0000089

f. 3.12×10^{-5}

Voorbeeld 1:

$$4.32 \times 10^4$$

$$4.32 \times 10^4 = 4.32 \times 10\,000 = 43\,200$$

$$43\,200$$

$$4.32 \times 10^{-4}$$

$$4.32 \times 10^{-4} = 4.32 \times 0.0001 = 0.000432$$

$$0.000432$$

$$43\,200 > 0.000432$$

a. 2.24×10^4 0.25×10^{-4}

b. 2.5×10^3 2.5×10^{-3}

c. 1.75×10^{-6} 1.75×10^6

d. 1.95×10^{-5} 1.95×10^5

e. 0.75×10^{-5} 0.75×10^{-5}

f. 0.5×10^2 0.5×10^{-2}

Probleemoplossing

Bereken: $2^{15} \times 2 =$

Wys al jou berekeninge.

Hersien die eksponentwette en gee vier voorbeelde van elk deur getalle te gebruik.

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

1. Gebruik die eksponentwette om die volgende te vereenvoudig:

Voorbeeld: $s^2 \times s^4 = s^{2+4} = s^6$

a. $a^3 \times a^4 =$

b. $b^2 \times b^5 =$

c. $2^8 \times 2^9 =$

d. $f^8 \times f^3 =$

e. $d^2 \times d^6 =$

f. $y^5 \times y^4 =$

2. Bereken die volgende:

Voorbeeld: $8^3 \times 8^2 = 8^{3+2} = 8^5 = 32\,768$

a. $2^5 \times 2^2 =$

b. $5^2 \times 5^3 =$

c. $3^4 \times 3^2 =$

e. $8^2 \times 8^3 =$

d. $7^3 \times 7^1 =$

f. $3^2 \times 3 =$

3. Gebruik die eksponentwette om die volgende te vereenvoudig:

Voorbeeld: $y^a \times y^b = y^{a+b}$

a. $a^m \times a^n =$

b. $d^e \times d^f =$

c. $v^g \times v^h =$

d. $e^j \times e^k =$

e. $x^l \times x^m =$

f. $b^p \times b^q =$

Probleemoplossing

Jy moet aan 'n maat, wat afwesig was, verduidelik hoe om die volgende te doen: Vermenigvuldig 5^9 met 5^7 deur 'n sakrekenaar te gebruik.

Hersien die eksponentwette en gee vier voorbeelde van elk deur veranderlikes te gebruik.

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

1. Gebruik die eksponentwette om die volgende te vereenvoudig:

Voorbeeld: $m^5 \div m^3 = m^{5-3}$ of $\frac{m^5}{m^3} = m^{5-3}$

a. $x^4 \div x^2 =$

b. $\frac{f^9}{f^3} =$

c. $x^5 \div x^2 =$

d. $\frac{b^8}{b^2} =$

e. $\frac{e^6}{e^4} =$

f. $h^7 \div h^3 =$

2. Bereken die volgende:

Voorbeeld: $2^4 \div 2^3 = 2^{4-3} = 2^1 = 2$

a. $\frac{2^3}{2^2}$

b. $4^4 \div 4^2 =$

c. $\frac{4^5}{4^4}$

d. $6^6 \div 6^3 =$

e. $3^7 \div 3^3 =$

f. $\frac{5^8}{5^5}$

3. Skryf die volgende as 'n breuk en gebruik dan die eksponentwette om die volgende te vereenvoudig:

Voorbeeld: $g^5 \div g^3 = \frac{g^5}{g^3} = g^{5-3} = g^2$

a. $a^4 \div a^3 =$

b. $d^6 \div d^5 =$

c. $g^6 \div g^4 =$

d. $f^9 \div f^6 =$

e. $c^8 \div c^2 =$

f. $j^{12} \div j^{10} =$

4. Gebruik die eksponentwette om die volgende te vereenvoudig:

a. $6^2 \times 6^3 =$

b. $4^2 \times 4^3 =$

c. $2^4 \times 2^5 =$

d. $10^3 \div 10^2 =$

e. $4^3 \div 4^2 =$

f. $2^5 \div 2^4 =$

Probleemoplossing

Jy moet aan 'n maat, wat afwesig was, verduidelik hoe om dit te doen: $5^5 \div 5^7$ sonder om 'n sakrekenaar te gebruik. Hoe gaan jy dit doen?

Gee 'n voorbeeld deur van getalle gebruik te maak en gee nog 'n voorbeeld deur van veranderlikes gebruik te maak.

$a^m \times a^n = a^{m+n}$	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ as $m < n$	$(a^m)^n = a^{mn}$

1. Gebruik die eksponentwette om die volgende te vereenvoudig:

Voorbeeld: $w^4 \div w^6 = w^{-3} = \frac{1}{w^3}$ of $\frac{w^4}{w^6} = w^{4-6} = w^{-2} = \frac{1}{w^2}$

a. $x^2 \div x^3 =$ b. $\frac{e^7}{e^9} =$ c. $\frac{f^3}{f^7} =$

d. $a^8 \div a^{10} =$ e. $\frac{k^4}{k^6} =$ f. $a^6 \div d^{11} =$

2. Bereken die volgende:

Voorbeeld: $\frac{2^4}{2^5}$ of $2^4 \div 2^5 = 2^{4-5} = 2^{-1} = \frac{1}{2}$

a. $\frac{2^3}{2^4} =$ b. $5^{10} \div 5^{12} =$ c. $7^6 \div 7^8 =$

d. $\frac{10^8}{10^{10}} =$ e. $11^9 \div 11^{11} =$ f. $\frac{8^6}{8^9} =$

3. Gebruik die eksponentwette om die volgende te vereenvoudig:

Voorbeeld: $\frac{x^m \div x^n}{x^t} = \frac{x^{m-n}}{x^t}$

a. $a^m \div a^n =$ b. $d^f \div d^g =$ c. $\frac{m^a}{m^b} =$

d. $f^x \div f^y =$ e. $\frac{e^k}{e^j} =$ f. $\frac{d^t}{d^u} =$

4. Gebruik die eksponentwette om die volgende te vereenvoudig:

Voorbeeld: $(q^2)^3 = (q^{2 \times 3}) = q^6$

a. $(m^3)^3 =$ b. $(k^5)^7 =$ c. $(n^4)^2 =$

d. $(r^3)^9 =$ e. $(z^5)^8 =$ f. $(s^7)^8 =$

5. Bereken die volgende:

Voorbeeld: $(3^2)^3 = (3^6) = 729$

a. $(2^3)^3 =$ b. $(8^3)^3 =$ c. $(4^3)^2 =$

d. $(2^4)^7 =$ e. $(3^4)^8 =$ f. $(3^5)^5 =$

6. Gebruik die eksponentwette om die volgende te vereenvoudig:

Voorbeeld: $(a^m)^n = a^{mn}$

a. $(a^m)^n =$ b. $(d^t)^y =$ c. $(h^p)^q =$

d. $(b^a)^b =$ e. $(c^t)^s =$ f. $(e^d)^e =$

Probleemoplossing

- a. Wat is die verskil tussen $x^2 \div x^3$ en $x^3 \div x^2$?
b. Los op: $(124)^2$

Exponentwetste: $a^0 = 1$ en $(a \times t)^n = a^n t^n$

Vervang die veranderlikes en eksponente in elk van hierdie voorbeelde deur getalle.

$a^m \times a^n = a^{m+n}$		$(xy)^m = x^m y^m$	
$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$		$x^1 = x$	
$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ OS $m < n$		$x^0 = 1$	
$(a^m)^n = a^{mn}$		$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	

1. Vereenvoudig:

Voorbeeld: $(a \times t)^3 = a^3 t^3$

a. $(b \times c)^5 =$		b. $(r \times s)^8 =$		c. $(c \times d)^3 =$	
d. $(t \times s)^9 =$		e. $(f \times a)^4 =$		f. $(k \times n)^6 =$	

2. Bereken die volgende:

Voorbeeld: $(2 \times 5)^2 = 2^2 \times 5^2 = 4 \times 25 = 100$

a. $(2 \times 3)^2 =$		b. $(6 \times 7)^2 =$		c. $(2 \times 10)^2 =$	
d. $(4 \times 3)^3 =$		e. $(2 \times 8)^4 =$		f. $(11 \times 3)^3 =$	

3. Gebruik die eksponentwette om die volgende te vereenvoudig:

a. $(a \times c)^b =$		b. $(y \times b)^c =$		c. $(m \times p)^n =$	
d. $(z \times t)^q =$		e. $(d \times f)^e =$		f. $(q \times t)^x =$	

4. Gebruik die eksponentwette om die volgende te vereenvoudig:

Voorbeeld: $a^0 = 1$ en $a^1 = a$

a. $a^0 =$		b. $c^0 =$		c. $d^0 =$	
d. $j^1 =$		e. $h^1 =$		f. $g^1 =$	

5. Bereken die volgende:

Voorbeeld: $12^0 = 1$ en $12^1 = 12$

a. $4^0 =$		b. $3^1 =$		c. $10^0 =$	
d. $5^1 =$		e. $8^0 =$		f. $11^1 =$	

6. Gebruik die eksponentwette om die volgende te vereenvoudig:

Voorbeeld: $5^{-3} = \frac{1}{5^3}$

a. $a^{-2} =$		b. $e^{-7} =$		c. $d^{-10} =$	
d. $x^{-3} =$		e. $b^{-8} =$		f. $g^{-7} =$	

7. Bereken die volgende:

Voorbeeld: $5^{-3} = \frac{1}{5^3} = \frac{1}{125}$

a. $3^{-2} =$		b. $2^{-1} =$		c. $7^{-2} =$	
d. $2^{-4} =$		e. $4^{-2} =$		f. $3^{-1} =$	

8. Gebruik die eksponentwette om die volgende te vereenvoudig:

Voorbeeld: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

a. $a^{-b} =$		b. $d^{-1} =$		c. $k^{-c} =$	
d. $n^{-x} =$		e. $b^{-n} =$		f. $r^{-b} =$	

Probleemoplossing

Vorm 'n groep van 4 tot 6 vriende en verdruk die eksponentwette aan mekaar. Help mekaar.

Hersien hierdie wette.

$a^1 = a$	$a^0 = 1$	$a^1 = \frac{1}{a^1}$	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
$a^m \times a^n = a^{m+n}$	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$(a^m)^n = a^{mn}$	$(ab)^n = a^n b^n$
	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ as $m < n$	

1. Gebruik die eksponentwette om die volgende te vereenvoudig. Onthou volgorde van bewerking:

- a. $(a^3 \times a^4) + (a^4 \div a^3) =$
- b. $x^3 \times x^4 \div x^4 =$
- c. $y^7 \div y^5 + y^2 =$
- d. $c^1 \times c^3 \div c^2 =$
- e. $(e^2 \times e^5) =$
- f. $(5^2 \times 5^3) \div 5^5 =$
- a. $3^2 \times 3^3 =$
- b. $4^8 \div 2^3 =$
- c. $5^3 \times 5^3 \div 5^2 =$
- d. $4^2 \div 2^2 =$
- e. $(12^5 \times 5^{-3}) =$
- f. $7^5 \div 7^9 =$

2. Gebruik die eksponentwette om die volgende te vereenvoudig:

- a. $3^2 \times 3^3 =$
- b. $4^8 \div 2^3 =$
- c. $5^3 \times 5^3 \div 5^2 =$
- d. $4^2 \div 2^2 =$
- e. $(12^5 \times 5^{-3}) =$
- f. $7^5 \div 7^9 =$

3. Gebruik die eksponentwette om die volgende te vereenvoudig:

- a. $3a \times 9a^4 =$
- b. $14c \times 7c^5 =$
- c. $2e^5 \div 4e^3 =$
- d. $8z^4 \div 2z^3 =$
- e. $125x^3 \div 25x^5 =$
- f. $32d^3 \div 422d =$

4. Hersiening: vereenvoudig:

- Voorbeeld: $2x^{-2} = 2 \times x^{-2} = 2 \times \frac{1}{x^2} = \frac{2}{x^2}$
- a. $3x^2 =$
- b. $9x^{-3} =$
- c. $7x^{-3} =$
- d. $4x^{-3} =$
- e. $5x^{-2} =$
- f. $8x^{-5} =$

5. Hersiening: vereenvoudig:

- Voorbeeld: $4^n = (2 \times 2)^n$
 $= (2^2)^n$
 $= 2^{2n}$
- a. $64^n =$
- b. $16^x =$
- c. $100^x =$
- d. $121^n =$
- e. $4^x =$
- f. $144^n =$

Toepassing van die eksponentwette vervolg

6. Hersiening: vereenvoudig:

Voorbeeld: $9^n \cdot 2^{n-1}$
 $= (3^2)^n \cdot 2^{n-1}$
 $= 3^{2n} \cdot 2^{n-1}$

a. $16^x \cdot 3^{x+1} =$

b. $36^x \cdot 3^{x+2} =$

c. $12^{1-x} \cdot 2^{x+1} =$

d. $9^x \cdot 4^{x+2} =$

e. $25^x \cdot 5^{x+1} =$

f. $100^x \cdot 3^{x+4} =$

7. Vereenvoudig:

Voorbeeld: $\frac{9^n \cdot 2^{n+1}}{4^n}$
 $= \frac{3^{2n} \cdot 2^{n+1}}{2^{2n}}$
 $= \frac{3^{2n} \cdot 2^{n+1-n}}{2^{2n-n}}$
 $= \frac{3^{2n} \cdot 2}{2^n}$
 $= \frac{2 \cdot 3^{2n}}{2^n}$

a. $\frac{8^n \cdot 2^{n+1}}{4^n}$

b. $\frac{16^n \cdot 3^{n+1}}{25^n}$

c. $\frac{36^n \cdot 4^{n+21}}{64^n}$

8. Faktoriseer:

Voorbeeld: $12^n = (12)^n = (2 \times 2 \times 3)^n = (2^2 \times 3)^n$
 $= 2^{2n} \times 3^n$
 $= 2^{2n} \cdot 3^n$

a. $20^n =$

b. $24^n =$

c. $54^n =$

d. $45^n =$

e. $18^n =$

9. Vereenvoudig:

Voorbeeld: $\frac{9^{n-1} \cdot 12^n}{4^{n+1} \cdot 27^n}$

Probeer om eksponente met dieselfde grondtal te kry.

$$\frac{(3^2)^{n-1} \cdot (2^2 \cdot 3)^n}{(2^2)^{n+1} \cdot (3^3)^n}$$

$$= \frac{3^{2n-2} \cdot 2^{2n} \cdot 3^n}{2^{2n+2} \cdot 3^{3n}}$$

Ons kan nou vereenvoudig deur die eksponente met dieselfde grondtal te verenigvuldig. Gebruik die eksponentwette om dit te doen.

$$= \frac{3^{2n-2} \cdot 3^n \cdot 2^{2n}}{2^{2n+2} \cdot 3^{3n}}$$

$$= \frac{3^{2n-2+n} \cdot 2^{2n}}{3^{3n} \cdot 2^{2n+2}}$$

$$= \frac{3^{3n-2} \cdot 2^{2n}}{3^{3n} \cdot 2^{2n+2}}$$

Kom ons deel nou die eksponente deur dieselfde grondtal.

$$= \frac{3^{3n-3n} \cdot 2^{2n+2-2n}}{3^{3n-3n} \cdot 2^{2n+2-2n}}$$

$$= \frac{3^{-2} \cdot 2^2}{3^0 \cdot 2^2}$$

$$= \frac{3^{-2} \cdot 1}{1 \cdot 2^2}$$

$$= \frac{1}{3^2} \cdot \frac{1}{2^2}$$

$$= \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{4}$$

$$= \frac{1}{36}$$

Probleemoplossing

Skryf al die eksponentwette neer wat jy vandag gebruik het. Ontwikkel jou eie som deur al hierdie wette te gebruik en los dit dan op.

Hersiening: Wat vertel elke stelling vir jou? Gee nog twee voorbeelde van elk.



Konstante verski bv. $-3; -7; -11; -15; \dots$ Tel in "4s" of "tel -4 by die vorige term".

Konstante verhouding bv. $-2; -4; -8; -16; -32; \dots$ "Vermenigvuldig die vorige term met -2."

Veranderlike verskil of verhouding bv. $1; 2; 4; 7; 11; 16; \dots$ "Tel die verskil tussen die 2 vorige terme bymekaar + 1 by die vorige term."

1. Beskryf die patroon deur die reël te gee en dit dan met drie terme uit te brei.

a. 2; 4; 6; 8; 10

Tel 2 by die vorige term.
12; 14; 16

c. $-6; -8; -10; -12$

d. $-30; -20; -10; 0; 10$

e. $-1; 5; 11; 17$

f. 15; 12; 9; 6; 3

2. Beskryf die patroon deur die reël te gee en dit dan met drie terme uit te brei.

a. 2; 4; 8; 16; 32; 64

b. 5; -20; 80; -320; 1 280

c. $729; 81; 9; 1; \frac{1}{9}; \frac{1}{81}$

d. 25; 5; 1; 0,2; 0,04

3. Beskryf die patroon deur die reël te gee en dit dan met drie terme uit te brei.

a. 2; 4; 12; 48; 240

b. 1; 5; 13; 29; 61; 125

c. 16; 19; 23; 28; 34

d. $1; -5; 2; -6; 3; -7$

4. V voltooi die tabel:

a.	Posisie in ry	2	4	6	8	10	n
	Term	-10	-8	-6	-4		

b.	Posisie in ry	1	3	5	7	10	n
	Term	-14	-12	-10	-8		

c.	Posisie in ry	3	6	9	10	12	n
	Term	-15	-12	-9		-6	

5. Bepaal die 10de en nde posisie van die term deur 'n tabel en getallesinne te gebruik.

a.	Posisie in ry	1	3	5	7	10	n
	Term	1	9	25	49		

b.	Posisie in ry	1	2	4	8	10	n
	Term	1	4	16	64		

c.	Posisie in ry	2	4	6	8	10	n
	Term	6	18	38	66		

d.	Posisie in ry	3	4	5	6	10	n
	Term	27	64	125	216		

e.	Posisie in ry	-5	0	5	10	15	n
	Term	-126	-1	124		3374	

f.	Posisie in ry	3	5	7	9	10	n
	Term	26	124	342	728		

Probleemoplossing

Ontwikkel nou jou eie rye soos volg:

- Konstante verskil tussen die opeenvolgende terme
- Konstante verhouding tussen die opeenvolgende terme
- Geen konstante verskil of konstante verhouding nie

Hersiening: Praat hieroor.

Position	1 ^{de} term	2 ^{de} term	3 ^{de} term	4 ^{de} term	5 ^{de} term
Waarde van die term	1	2	3	4	5
	?	16	24	32	40

1 × 8 2 × 8 3 × 8 4 × 8 5 × 8

Lees die boonstery.

Die posisie: 1ste term, 2de term, 3de term, 4de term, 5de term, n de termAs die 2de term se posisie 2 is en die waarde daarvan 16 is, is die reël $2 \times 8 = 16$.

Wat is die waard van die 1ste term?

Jy moet seker maak jy ken al hierdie meetkundige figure.



1. Ontwerp en voltooi die volgende meetkundige patrone.

- Trek die eerste vier terme in elkeen van die volgende meetkundige patrone.
- Skrif dit in 'n tabel en bepaal die 1ste, 2de, 3de, 4de en n de terme waar van toepassing.

Voorbeeld: Vierkant

Posisie	1 ^{ste}	2 ^{de}	3 ^{de}	4 ^{de}	n ^{de}
Waarde	1	4	9	16	n^2

1² 2² 3² 4² n^2

a. Driehoek

Posisie	1 ^{ste}	2 ^{de}	3 ^{de}	4 ^{de}	n ^{de}
Waarde				10	$\frac{n(n+1)}{2}$

b. Pentagoon

Posisie	1 ^{ste}	2 ^{de}	3 ^{de}	4 ^{de}	n ^{de}
Waarde				22	$\frac{n(3n-1)}{2}$

c. Nonagoon

Posisie	1 ^{ste}	2 ^{de}	3 ^{de}	4 ^{de}	n ^{de}
Waarde			24		$n(2n-1)$

2. Wat is die reël? Voltooi hierdie tabelle.

Voorbeeld: Reël is $2x + 1$

x	-2	-1	0	1	2	5	10
y	-3	-1	1	3	5	11	21

a. Reël: $y = 3x - 1$

x	-2	-1	0	1	2	10	50
y							

b. Reël: $y = \frac{1}{2}x + 2$

x	0	2	3	50	75	100
y						

c. Reël: $y = x - 5$

x	-3	-2	-1	0	1	13	25
y							

d. Reël: $y = 5x - 4$

x	1	3	5	7	27	47
y						

3. Gee die reël en voltooi die tabel.

a. Reël: $y = x \times -2$

x	-2	-1	0	1	2	5	n
y						m	

b. Reël: $y = 10(x + 2)$

x	-3	5	13	21	29	37	n
y						m	

Probleemoplossing

Maak jou eie reël en gee 'n tabel aan 'n maat om op te los.

Beskou en bespreek:

eksponente konstante veranderlike

$$2x^4 + x^2 + 6x - 1$$

terme

monoom (1 terme)

$$8x^4 \quad (a + b)$$

binoom (2 terme)

$$3x^2 + 4 \quad a + b$$

trinoom (3 terme)

$$4x^2 + x^2 + 3$$

'n Polinoom is 'n algebraïese uitdrukking wat een of meer terme met nie-negatiewe heelgetal-eksponente bevat. $4x^2 + 2y^2$

Terme word geskei deur + en -; nie deur $\times$ en $\div$ nie.

1. Hersiening: vereenvoudig.

Voorbeeld: $3a^2 + 4a^2 = 7a^2$

Voorbeeld: $3a^2 - 2a + 4a^2 + 6a = 3a^2 + 4a^2 - 2a + 6a = 7a^2 + 4a$

Voorbeeld: $3a^2 + 2a - 5 + 4a^2 - 6a + 6 = 3a^2 + 4a^2 + 2a - 6a - 5 + 6 = 7a^2 - 4a + 1$

Voorbeeld: $4ab^2 + 3ab + 3ab^2 + 2ab = 7ab^2 + 5ab$

2. Pas kolom A by kolom B:

A	B
Monoom	$3xy^2 + 2x + 4x - 5$
Binoom	$3xy^2 + 2x$
Trinoom	$3xy^2$
Polinoom	$3xy^2 + 2x + 5$

3. Skep jou eie algebraïese uitdrukking wat ook 'n:

- binoom is: $8xy^2 + 5xy + 2x + 7xy^2$
- polinoom is: $5ab^2 + 6ab + 7a + 6ab^2$
- trinoom is: $7cd^2 + 8cd + 8cd^2 + 8cd$
- monoom is: $9ef^3 + 4ef^2 + 5ef^2 + 5ef^3$

Voorbeeld: 'n monoom: $(3ab^3) + 4ab + 6b - 8$

4. Hersiening: vereenvoudig.

Voorbeeld: $3x^2 + 5x + 4 + 5x^2 - 2x - 1 = 8x^2 + 3x + 3$

b. $6a^2 + 8a + 5a^2 + 2 - 3 + 7a =$

d. $5x - 4 - 7x - 8x^2 - 2 - 3x^2 =$

5. Vereenvoudig.

Voorbeeld: $2x^3 + 4x + 5x^2 + 8 + 6 + 5x^3 = 7x^3 + 5x^2 + 4x + 14$

a. $4x^3 + 2x^2 + 8 - 5x^3 - 4x^2 =$

6. Vereenvoudig.

Voorbeeld: $4x^2 + 4x + 2x + 3y^2 + 5x^2 = 9x^2 + 3y^2 + 6x$

a. $4x^2 + 2y^3 + 2y^2 + 3x^2 + 3y^3 =$

7. Vereenvoudig.

Voorbeeld: $3ab + 4ab^2 + 2ab + ab^2 + ab = 5ab^2 + 6ab$

a. $3xy^2 + 5xy + 4xy^2 + 8xy + 6xy =$

8. Vereenvoudig.

Voorbeeld: $5a^2b^3 + 6ab + 2a^2b^3 + 2ab + ab = 7a^2b^3 + 9ab$

a. $3x^2y^3 + 7xy + 4xy^2 + 5x^2y^3 + 5xy^2 =$

b. $4a^2b^4 + 5a^3b^2 + 7ab - 3a^2b^4 + 2a^3b^2 =$

Probleemoplossing

- Ontwikkel 'n algebraïese uitdrukking met drie verskillende gelyksoortige terme en vereenvoudig.
- Skrif 'n polinoom met vyf terme, waar twee pare soortgelyke terme is.
- As die antwoord $5x^2 + 7y^2 + 9x$ is en die oorspronklike som sewe terme gehad het, wat kan die oorspronklike som dan wees?
- Skrif 'n polinoom met vyftien terme en vereenvoudig. Let op dat jy gelyksoortige terme in jou polinoom moet gebruik.

Hersien:

$$-2x(x+2)$$

$$-2x \quad x \quad 2$$

$$-2x^2 - 4x$$

Onthou om die monoom met elke term van die binoom te vermenigvuldig.

$$5x(2x^2 + 3x - 4)$$

$$5x \quad 2x^2 \quad 3x \quad -4$$

$$10x^3 \quad 15x^2 \quad -20x$$

Onthou om die monoom met elke term van die trinoom te vermenigvuldig.

1. Hersiening: vereenvoudig.

Voorbeeld $2(3+4)$
 $= (2 \times 3) + (2 \times 4)$
 $= 6 + 8$
 $= 14$

2. Hersiening: vereenvoudig.

Voorbeeld $a(b+c)$
 $= a \times b + a \times c$
 $= ab + ac$

3. Hersiening: vereenvoudig.

Voorbeeld $3(a+b)$
 $= (3 \times a) + (3 \times b)$
 $= 3a + 3b$

4. Hersiening: vereenvoudig.

Voorbeeld $x(2+4)$
 $= (x \times 2) + (x \times 4)$
 $= 2x + 4x$
 $= 6x$

5. Vereenvoudig.

Voorbeeld: Metode 1

$$2x(3x^2 - 4x + 5)$$

$$= 6x^{1+2} - 8x^{1+1} + 10x$$

$$= 6x^3 - 8x^2 + 10x$$

Metode 2

$$2x(3x^2 - 4x + 5)$$

$$2x \quad 3x^2 \quad -4x \quad 5$$

$$6x^3 \quad -8x^2 \quad +10x$$

a. $4x(x^2 - 2x + 2) =$

b. $7x(2x^2 - 4x + 10) =$

c. $x(3x^2 + 4x + 5) =$

d. $3x(5x^2 - 2x + 6) =$

e. $5x(x^2 - 3x - 2) =$

f. $6x(2x^2 + 4x + 7) =$

6. Vereenvoudig deur albei metodes te gebruik:

Voorbeeld: Metode 1

$$2x(3x^2 - 4x + 5)$$

$$= 6x^3 - 8x^2 + 10x$$

Metode 2

$$2x(3x^2 - 4x + 5)$$

$$= (2x \cdot 3x^2) + (2x \cdot -4x) + (2x \cdot 5)$$

$$= 6x^{1+2} - 8x^{1+1} + 10x$$

$$= 6x^3 - 8x^2 + 10x$$

a. $-x(2x^2 + 3x + 2) =$

b. $-4x(-3x^2 - 5x - 4) =$

Die produk van 'n monoom en binoom of trinoom vervolg

30b

c. $-3x(-x^2 + 2x - 6) =$

d. $-2x(3x^2 + 7x + 1) =$

e. $-5x(2x^2 - 4x - 8) =$

f. $-6x(-3x^2 - 6x + 3) =$

7. As $x = 3$, evalueer:

a. $4x^2 + 3x + 2 =$

b. $5x^2 - 6x + 8 =$

c. $-3x^2 - 2x + 3 =$

d. Probeer dit nou met $x = -3$

8. Vereenvoudig en evalueer as $x = -2$.

a. $2x(6x^2 + 3x + 5) =$

b. $-3x(2x^2 + 6x + 9) =$

c. $4x(3x^2 - 2x - 2) =$

Maak seker jy vermenigvuldig die monoom met al die terme van die trinoom.

Probleemoplossing

Die $a \times$ (maal) kan oor die 2 + 4 in 'n $a \times 2$ plus 'n $a \times 4$ "versprei word". Hoe het die oorspronklike som gelyk?

Ontwikkel jou eie monoom wat vermenigvuldig word met 'n trinoom en vereenvoudig dit.

Gebruik dieselfde monoom wat vermenigvuldig word deur 'n trinoom. Vereenvoudig dit dan deur middel van substitusie.

Vergelyk die volgende:

Het jy geweet dat jy jou kennis van kaartreëls kan help om die produk van twee binome te bereken? Maak gebruik van die kolomme en rye om twee binome te vermenigvuldig.

$$(x+2)(x+2)$$

$$x + 2$$

x	x^2	$2x$
$+$		
2	$2x$	4

$$x^2 + 4x + 4$$

$$(x-2)(x-2)$$

$$x - 2$$

x	x^2	$-2x$
$-$		
2	$-2x$	4

$$x^2 - 4x + 4$$

$$(x+2)(x-2)$$

$$x - 2$$

x	x^2	$-2x$
$+$		
2	$2x$	-4

$$x^2 + x - 4$$

1. Vereenvoudig die volgende:

Voorbeeld $(x+2)(x+3)$

$$= (x+2)(x+3)$$

$$= (x \times x) + (x \times 3) + (2 \times x) + (2 \times 3)$$

$$= x^{1+1} + 3x + 2x + 6$$

$$= x^2 + 3x + 2x + 6$$

$$= x^2 + 5x + 6$$

$$x + 3$$

x	x^2	$3x$
$+$		
2	$2x$	6

$$x^2 + 5x + 6$$

a. $(x+1)(x+2) =$

b. $(a+2)(a+7) =$

c. $(x+5)(x+4) =$

2. Vereenvoudig:

Voorbeeld $(x-2)(x-3)$

$$= (x-2)(x-3)$$

$$= (x \times x) + (x \times -3) + (-2 \times x) + (-2 \times -3)$$

$$= x^{1+1} - 3x - 2x + 6$$

$$= x^2 - 5x + 6$$

x	x^2	$-3x$
$-$		
2	$-2x$	-6

$$x^2 - 5x - 6$$

a. $(x-5)(x-2) =$

b. $(a-10)(a-3) =$

c. $(x-7)(x-6) =$

3. Vereenvoudig:

Voorbeeld $(x+2)(x-3)$

$$= (x+2)(x-3)$$

$$= (x \times x) + (x \times -3) + (2 \times x) + (2 \times -3)$$

$$= x^{1+1} - 3x + 2x - 6$$

$$= x^2 - x - 6$$

x	x^2	$-3x$
$+$		
2	$2x$	-6

$$x^2 - x + 6$$

a. $(x+1)(x-4) =$

b. $(4a+3)(a-8) =$

c. $(2x+3)(x-2) =$

4. Vereenvoudig:

Voorbeeld $(x-2)(x+3)$

$$= (x-2)(x+3) \\ = (x \times x) + (x \times 3) + (-2 \times x) + (-2 \times -3) \\ = x^2 + 3x - 2x - 6 \\ = x^2 + x - 6$$

$$\begin{array}{r} x \quad + \quad 3 \\ x \quad \quad x^2 \quad -3x \\ - \quad \quad -2x \quad -6 \\ 2 \end{array} \quad x^2 + x - 6$$

a. $(x-3)(x+4) =$

b. $(2a-3)(a+1) =$

c. $(x-5)(x+1) =$

5. Vereenvoudig:

Voorbeeld

$$(x \pm 2)^2 \\ = (x+2)(x+2) \text{ en } (x-2)(x-2) \\ = x^2 + 2x + 2x + 4 \text{ en } x^2 - 2x - 2x + 4 \\ = x^2 + 4x + 4 \text{ en } x^2 - 4x + 4 \\ = x^2 \pm 4x + 4$$

$$\begin{array}{r} x \quad + \quad 2 \\ x \quad \quad x^2 \quad -2x \\ + \quad \quad 2x \quad 4 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x \quad - \quad 2 \\ x \quad \quad x^2 \quad -2x \\ - \quad \quad -2x \quad 4 \\ 2 \end{array}$$

a. $(x \pm 1)^2 =$

b. $(a \pm 6)^2 =$

6. Vereenvoudig:

Voorbeeld $2(x-3)^2$

$$= 2[(x-3)(x-3)] \\ = 2[x^2 - 3x - 3x + 9] \\ = 2[x^2 - 6x + 9] \\ = 2x^2 - 12x + 18$$

$$\begin{array}{r} x \quad - \quad 3 \\ x \quad \quad x^2 \quad -3x \\ - \quad \quad -3x \quad 9 \\ 3 \end{array}$$

a. $2(x+2)^2 =$

b. $2(x+7)^2 =$

7. Vereenvoudig:

a. $2(x-3)^2 - 3(x+1)(2x-5) =$

b. $3(x+4)^2 - 2(x+3)(3x-6) =$

Probleemoplossing: Wees kreatief

Ontwikkel twee binome en vereenvoudig die produk.

Ontwikkel twee binome en vereenvoudig die produk. Gebruik heelgetalle om te evalueer.

Ontwikkel twee binome en vereenvoudig die produk. Gebruik +/- bewerking.

Ontwikkel twee binome en vereenvoudig die produk. Gebruik +/- bewerking asook koëffisiënte.

Kan jy nog onthou wat 'n faktor is?

Faktore is getalle wat jy saam vermenigvuldig om 'n ander getal te kry.

O ja, die faktore van 12 is mos: 1, 2, 3, 4, 6 en 12, want $1 \times 12 = 2 \times 6 = 3 \times 4 = 12$

Wat is die faktore van $x^2 + 7x + 12$?

Jy moet vra watter twee binome, wanneer dit saam vermenigvuldig word, vir jou hierdie trinoom sal gee.

- Skryf twee hakies () ()
- Faktoreiseer $x^2 = (x)(x)$
- Faktoreiseer $12 = (3)(4)$ en maak seker dat die som van hierdie twee faktore vir jou 7 gee.
- Vul jou bewerkings in $(x + 3)(x + 4)$.

1. Faktoreiseer:

Voorbeeld $x^2 + 5x + 6$
 $= x^2 + 5x + 6$
 $= (x + 3)(x + 2)$



Toets: $x^2 + 2x + 3x + 6$
 $x^2 + 5x + 6$

Die produk van die twee faktore gee vir my 6, maar as dit opgetel word sal dit vir my 5 gee.

a. $x^2 + 5x + 6 =$

b. $x^2 + 6x + 8 =$

c. $x^2 + 2x + 14 =$

d. $x^2 + 11x + 10 =$

e. $x^2 + 15x + 54 =$

f. $x^2 + 12x + 27 =$

2. Faktoreiseer:

Voorbeeld $x^2 - 5x + 6$
 $= x^2 - 5x + 6$
 $= x^2 - 5x + 6$
 $= (x - 3)(x - 2)$



Die produk van die twee faktore gee vir my 6, maar as dit opgetel word sal dit vir my -5 gee.

a. $x^2 + x - 6 =$

b. $x^2 + 3x - 54 =$

c. $x^2 + 4x - 60 =$

d. $x^2 + 5x - 14 =$

e. $x^2 - x - 56 =$

f. $x^2 + 7x - 8 =$

3. Faktoreiseer:

Voorbeeld $x^2 - 5x + 6$
 $= (x - 2)(x - 3)$



a. $x^2 - 7x + 12 =$

b. $x^2 - 13x + 42 =$

c. $x^2 - 11x + 30 =$

d. $x^2 - 9x + 20 =$

e. $x^2 - 15x + 56 =$

f. $x^2 - 8x + 15 =$

Probleemoplossing

Bepaal die faktore van $x^2 + 11x + 24$

Hersien dit:

Eksponentwette
– met veranderlikes

$$\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$$

– met konstantes

$$\frac{2^3}{2^2} = 2^{3-2}$$

Hoe vinnig kan jy dit vereenvoudig?

$\frac{16}{8} = 2$	$\frac{20}{4} =$	$\frac{12}{3} =$	$\frac{21}{7} =$
$\frac{25}{5} =$	$\frac{30}{3} =$	$\frac{9}{3} =$	$\frac{15}{5} =$

1. Vereenvoudig:

Voorbeeld: Gebruik die eksponentwette

$$\begin{aligned}\frac{6x^3}{2x} &= \frac{6x^3}{2 \cdot x} \\ &= \frac{2 \cdot 3 \cdot x \cdot x}{2 \cdot x} \\ &= 3x^2\end{aligned}$$



Gebruik 'n ander metode om jou antwoord na te gaan.

a. $\frac{8x^3}{2x} =$

b. $\frac{16x^2}{8x} =$

c. $\frac{12x^4}{3x} =$

d. $\frac{20x^5}{4x} =$

e. $\frac{18x^5}{9x^4} =$

f. $\frac{21x^5}{7x^2} =$

2. Vereenvoudig:

Voorbeeld: Gebruik die eksponentwette

$$\begin{aligned}\frac{6x^3 + 8x^2}{2x} &= \frac{6x^3}{2x} + \frac{8x^2}{2x} \\ &= \frac{2 \cdot 3 \cdot x \cdot x}{2 \cdot x} + \frac{2 \cdot 4 \cdot x \cdot x}{2 \cdot x} \\ &= 3x^{3-1} + 4x^{2-1} \\ &= 3x^2 + 4x\end{aligned}$$

Gebruik 'n ander metode om jou antwoord na te gaan.

$$\begin{aligned}\frac{6x^3 + 8x^2}{2x} &= \frac{6x^3}{2x} + \frac{8x^2}{2x} \\ &= 3x^{3-1} + 4x^{2-1} \\ &= 3x^2 + 4x\end{aligned}$$

a. $\frac{6x^3 + 9x^2}{3x} =$

b. $\frac{16x^3 + 8x^2}{4x} =$

c. $\frac{25x^3 - 15x^2}{5x} =$

d. $\frac{24x^4 - 12x^3}{6x} =$

e. $\frac{8x^5 + 10x^3}{2x} =$

f. $\frac{30x^5 - 9x^4}{3x^2} =$

Probleemoplossing

Ontwikkel jou eie vyf voorbeelde van binome gedeel deur monome.

Onthou jy wat substitusie is? Hoe kan jy substitusie gebruik om die volgende te evalueer as $x = -5$?

$x + 0,2$

x^2

$5x$

$2x^2 + x$



Nou kan jy sien hoekom dit belangrik is om jou maatstafes goed te ken!

1. Hersiening: As $x = 2$, evalueer:

Voorbeeld: $x + 5$
 $= 2 + 5$
 $= 7$

a. $x + 9 =$

b. $-x \times 2 =$

2. As $x = 2$, evalueer:

Voorbeeld: $x^2 + 3x + 4$
 $= (2)^2 + 3(2) + 4$
 $= 4 + 6 + 4$
 $= 14$

As $x = -2$, evalueer:
 $x^2 + 3x + 4$
 $= (-2)^2 + 3(-2) + 4$
 $= 4 - 6 + 4$
 $= 2$

Hoekom verskil hierdie antwoorde?

a. $x^2 + 6x + 5 =$

b. $2x^2 + 9x + 1 =$

c. $x^2 + 9x + 6 =$

d. $5x^2 + 3x + 2 =$

e. $8x + x^2 - 5 =$

f. $8 - x^2 - 5x =$

3. Evalueer die uitdrukking as $x = -3$, en as $x = \frac{1}{3}$:

Voorbeeld: $-x^2 + 3x + 4$

As $x = \frac{1}{3}$, dan:

$$= -\left(\frac{1}{3}\right)^2 + 3\left(-\frac{1}{3}\right) + 4$$

$$= -\frac{1}{9} - 1 + 4$$

$$= -\frac{1}{9} + 3$$

$$= 2\frac{8}{9}$$

As $x = -\frac{1}{3}$, dan:

$$= -\left(-\frac{1}{3}\right)^2 + 3\left(\frac{1}{3}\right) + 4$$

$$= -\frac{1}{9} + 1 + 4$$

$$= 4\frac{8}{9}$$

a. $-x^2 + 4x + 2 =$

b. $-x^2 + 5x + 3 =$

c. $6 + 5x - 4x^2 =$


d. $7 + 2x^2 - 5x =$

e. $-2x^2 - x + 5 =$

f. $-3 - 5x^2 + 5 =$

Probleemoplossing

As jou antwoord -15 is, skryf dan 'n maontlik trinoom neer.
 As jou antwoord 15 is, skryf dan 'n maontlike trinoom neer.



Faktoriseer algebraïese uitdrukkings

35a

Hoe vinnig kan jy die volgende faktoriseer?

Voorbeeld: $3 - 27$
 $= 3(1 - 9)$

$4 + 16 =$

$5 - 25 =$

$6 + 42 =$

$7 + 56 =$

$9 + 99 =$

$48 - 6 =$



3 is die gemeenskaplike faktor.

1. Faktoriseer:

a.

$(a + b)$ is die gemeenskaplike faktor.

Voorbeeld $2x(a + b) + 3(a + b)$
 $= (a + b)(2x + 3)$

$4x(c + d) + 2(c + d) =$

Wat is die gemeenskaplike faktor?

b.

Voorbeeld $2x(a - b) + 3(a - b)$
 $= (a - b)(2x + 3)$

$4x(a - b) - 5(a - b) =$

Wat is die gemeenskaplike faktor?

c.

Voorbeeld $(3a + b)(x) + (3a + b)(y)$
 $= (3a + b)(x + y)$

$(3a + b)(m) + (3a + b)(n) =$

$(3a + b)$ is die gemeenskaplike faktor.
What is the gemeenskaplike faktor?

2. Faktoriseer:

Voorbeeld $(3a + b)(p - 2t) - (3a + b)(2p + 2t)$
 $= (3a + b)[(p - 2t) - (2p + 2t)]$
 $= (3a + b)(p - 2t - 2p - 2t)$
 $= (3a + b)(-p - 4t)$
 $= -(3a + b)(p + 4t)$

$(3a + b)$ is die gemeenskaplike faktor.

a. $(2a + b)(p - 3t) + (2a + b)(p + 3t) =$

b. $(3x + y)(a + b) - (3x + y)(a - b) =$

Voorbeeld $ax - bx$
 $= x(a - b)$

c. $cx + dx =$

d. $mx + nx =$

Voorbeeld $ax - bx + 2a - 2b$
 $= x(a - b) + 2(a - b)$
 $= (a - b)(x + 2)$

e. $ax + bx + 4a + 4b =$

f. $2m - 2n + 3m + 3n =$

g. $x - 2y =$

h. $2y - x =$

Voorbeeld 1: $a - 4b = 1(a - 4b)$

Voorbeeld 2: $4b - a = -1(a - 4b)$

i. $2a^2 - 18 =$

j. $5a^2 + 30 =$

Voorbeeld $3a^2 - 27$
 $= 3(a^2 - 9)$

3. Faktoriseer:

Voorbeeld: $a^4 - a^2$
 $= a^2 \left[\frac{a^4}{a^2} - \frac{a^2}{a^2} \right]$
 $= a^2 [a^{4-2} - 1]$
 $= a^2 [a^2 - 1]$
of
 $a^4 - a^2$
 $= (a, a, a, a) - (a, a)$
 $= a, a(a, a - 1)$
 $= a^2(a^2 - 1)$

d. $x^5 - x^3 =$

b. $d^8 + d^4 =$

c. $6b^4 - 3b^2 =$

d. $8a^6 - 6a^4 =$

Voorbeeld: $6a^4 - 4a^2$
 $= 2a^2(3a^2 - 2)$
of
 $6a^4 - 4a^2$
 $= 2a^2 \left(\frac{6a^4}{2a^2} - \frac{4a^2}{2a^2} \right)$
 $= 2a^2 - (3a^{4-2} - 4a^{2-2})$
 $= 2a^2(3a^2 - 2a^0)$
 $= 2a(3a^2 - 2)$

4. Faktoriseer:

Voorbeeld $(a+b)^2$
 $= (a+b)(a+b)$

Voorbeeld $(a+b)^2 - 5(a+b)$
 $= (a+b)(a+b) - 5(a+b)$
 $= (a+b)[(a+b) - 5]$
 $= (a+b)(a+b-5)$

5. Faktoriseer:

Voorbeeld: $25a^2$
 $= (5a)^2$

Let op dat:
 $1 = 1^2 = 1 \times 1$

Voorbeeld: $25a^2 - 1$
 $= (5a)^2 - 1$

6. Hersiening: Gebruik die voorbeeld as riglyn vir jou faktoriserings.

Voorbeeld: $a^2 + b^2$
 $= (a)^2 + (b)^2$

7. Faktoriseer:

Voorbeeld: $a^4 - b^4$
 $= (a^2 - b^2)(a^2 + b^2)$
 $= (a-b)(a+b)(a^2 + b^2)$

a. $(a+b)^3 =$

b. $(x+y)^2 =$

c. $(x+y)^2 - 6(x+y) =$

d. $(d+e)^2 - 2(d+e) =$

a. $16a^2 =$

b. $64a^2 =$

c. $9a^2 - 1 =$

d. $49a^2 - 1 =$

a. $x^2 + y^2 =$

b. $c^2 + d^2 =$

a. $x^4 - y^4 =$

b. $c^4 - d^4 =$

Voorbeeld:

$$\begin{aligned} 9(a+b)^2 - 1 &= [3(a+b)]^2 - 1^2 \\ &= [3(a+b) + 1][3(a+b) - 1] \\ &= (3a+3b+1)(3a+3b-1) \end{aligned}$$

c. $64(x+y)^2 + 1 =$

d. $25(a+b)^2 - 1 =$

8. Vereenvoudig deur faktoriserings te gebruik:

Voorbeeld: $3x - 3y$
 $= 3(x-y)$

a. $5x + 5y =$

b. $7a + 7b =$

Voorbeeld:

$$\begin{aligned} \frac{3x-3y}{6x-6y} &= \frac{3(x-y)}{6(x-y)} \\ &= \frac{3}{6} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

c. $\frac{4x+4y}{16x+16y} =$

d. $\frac{5x-5y}{10x+10y} =$

Probleemoplossing

Ontwikkel 'n algebraïese uitdrukking waarin die gemeenskaplike uitdrukking is:

a.

b.

c.

$$4a + b$$

$$(x^2 + y^2)$$

$$(x + y)^2$$

Gee 'n voorbeeld van elk:

trinoom
monoom

polinoom
monoom

Skryf 'n paar sleutelwoorde neer om jou te help om te onthou hoe om te:

Vereenvoudig:

Faktoriseer:

1. Vereenvoudig die breuke deur faktoriserings te gebruik:

Voorbeeld: $\frac{3x-3y}{6x-6y}$
 $= \frac{3(x-y)}{6(x-y)}$

a. $\frac{5x+5y}{16x+16y}$

b. $\frac{7a+7b}{10x+10y}$

Voorbeeld: $\frac{3x-3y}{6x-6y}$
 $= \frac{3(x-y)}{6(x-y)}$
 $= \frac{3}{6}$
 $= \frac{1}{2}$

c. $\frac{4x+4y}{16x+16y}$

d. $\frac{5x-5y}{10x+10y}$

2. Vereenvoudig en faktoriseer:

Voorbeeld: Vereenvoudig: $\frac{4x^4-2x^3}{2x^2}$
 $= \frac{4x^4}{2x^2} - \frac{2x^3}{2x^2}$
 $= 2x^{4-2} - x^{3-2}$
 $= 2x^2 - x$

Faktoriseer: $\frac{4x^4-2x^3}{2x^2}$
 $= \frac{2x^3(2x^2-x)}{2x^2}$
 $= 2x^2 - x$

a. $\frac{6x^5-63}{3x^2}$

b. $\frac{8x^{12}+16x^6}{4x^3}$

Voorbeeld: Vereenvoudig:

$$\frac{6x^3-8x^2+2x}{2x}$$

$$= \frac{6x^3}{2x} - \frac{8x^2}{2x} + \frac{2x}{2x}$$

$$= 3x^{3-1} - 4x^{2-1} + 1$$

$$= 3x^2 - 4x + 1$$

Faktoriseer:

$$\frac{6x^3-8x^2+2x}{2x}$$

$$= \frac{2x(3x^2-4x+1)}{2x}$$

$$= 3x^2-4x+1$$

c. $\frac{9x^4+6x^2+3x}{3x}$

d. $\frac{8x^5-4x^3-4x}{2x}$

Voorbeeld:

$$\frac{6x^3-8x^2+2x+10}{2x}$$

$$= \frac{6x^3}{2x} - \frac{8x^2}{2x} + \frac{2x}{2x} + \frac{10}{2x}$$

$$= 3x^{3-1} - 4x^{2-1} + 1 + \frac{5}{x}$$

$$= 3x^2 - 4x + 1 + \frac{5}{x}$$

Faktoriseer:

$$\frac{2x(3x^2-4x+10)}{2x}$$

$$= 3x^2-4x+1+\frac{10}{2x}$$

$$= 3x^2-4x+1+\frac{5}{x}$$

e. $\frac{6x^3+4x^2+2x+6}{2x}$

f. $\frac{9x^4+6x^3-3x-9}{3x}$

Probleemoplossing

Ontwikkel 'n polinoom gedeel deur 'n monoom. Vereenvoudig en faktoriseer die uitdrukking.

Beskou die drie voorbeelde. Bespreek.

$$4a + 5 = 17$$

$$3x = 6$$

$$3(x-2) = x+1$$

$$4a = 17 - 5$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{6}{3}$$

$$3x - 6 = x + 1$$

$$4a = 12$$

$$3x - x - 6 = 1$$

$$x = 2$$

$$2x = 7$$

$$\frac{4a}{4} = \frac{12}{4}$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{7}{2}$$

$$a = 3$$

$$x = 3\frac{1}{2}$$

1. Los die lineêre vergelyking op:

Voorbeeld: $4x = 2$

$$\frac{4x}{4} = \frac{2}{4}$$

$$x = \frac{1}{2}$$

a. $6a = 3$

b. $9b = 10$

2. Los vir x op:

Voorbeeld: $7 = \frac{3}{x}$

$$\frac{7}{1} \times \frac{x}{1} = \frac{3}{x} \times \frac{x}{1}$$

$$7x = 3$$

$$\frac{7x}{7} = \frac{3}{7}$$

$$x = \frac{3}{7}$$

a. $8 = \frac{4}{x}$

b. $9 = \frac{3}{x}$



'n Lineêre vergelyking is 'n vergelyking wat 'n reguitlyn maak op 'n grafiek. Dit het slegs een onbekende getal en dit is net tot die mag van 1.

3. Los vir x op:

Voorbeeld:

$$\frac{7}{x-2} = \frac{3}{x}$$

$$\frac{7}{x-2} \times \frac{x-2}{1} = \frac{3}{x} \times \frac{x-2}{1}$$

$$7 = \frac{3}{x} \times \frac{x-2}{1}$$

$$7 = \frac{3(x-2)}{x}$$

$$7 \times \frac{x}{1} = \frac{3}{x} \times \frac{x-2}{1} \times \frac{x}{1}$$

$$7 \times \frac{x}{1} = \frac{3(x-2)}{1} \times \frac{x}{1}$$

$$7x = 3(x-2)$$

$$7x = 3x - 6$$

$$7x - 3x = 3x - 3x - 6$$

$$4x = -6$$

$$\frac{4x}{4} = \frac{-6}{4}$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

a. $\frac{8}{x+2} = \frac{4}{x}$

b. $\frac{5}{x-3} = \frac{2}{x}$

4. Los lineêre vergelykings op wat breuke bevat.

Voorbeeld: $\frac{x}{3} = 1$

$$\frac{x}{3} \times \frac{3}{1} = 1 \times \frac{3}{1}$$

$$x = 3$$

a. $\frac{x}{2} = 1$

b. $\frac{x}{5} = 1$

Lineêre vergelykings wat breuke bevat

vervolg

Voorbeeld:

$$\frac{2x-1}{4} = 1$$

$$\frac{2x-1}{4} \cdot \frac{4}{1} = 1 \cdot \frac{4}{1}$$

$$2x-1=4$$

$$2x=4$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{4}{2}$$

$$x=2$$

$$x=2\frac{1}{2}$$

c. $\frac{3x+1}{5} = 1$

d. $\frac{4x-2}{6} = 1$

Voorbeeld:

$$\frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 1$$

$$\frac{x}{3} \times \frac{4}{4} + \frac{x}{4} \times \frac{3}{3} = 1$$

$$\frac{4x}{12} + \frac{3x}{12} = 1$$

$$\frac{5x}{12} = 1$$

$$\frac{7x}{12} \times \frac{12}{1} = 1 \times 12$$

$$7x=12$$

$$x=\frac{12}{7}$$

e. $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 1$

f. $\frac{x}{5} + \frac{x}{3} = 1$

Voorbeeld:

$$\frac{x}{3} = \frac{2x-1}{4} = 1$$

$$\frac{x}{3} \times \frac{4}{4} + \frac{2x-1}{4} \times \frac{3}{3} = 1$$

$$\frac{4x}{12} + \frac{6x-3}{12} = 1$$

$$\frac{4x+6x-3}{12} \times \frac{12}{1} = 1 \times \frac{12}{1}$$

$$4x+6x-3=12$$

$$10x-3=12$$

$$10x=15$$

$$\frac{10x}{10} \times \frac{15}{10} = 15$$

$$x=\frac{3}{2}$$

$$x=1\frac{1}{2}$$

g. $\frac{x}{4} + \frac{2x+1}{2} = 1$

h. $\frac{x}{5} + \frac{3x-2}{2} = 1$

Probleemoplossing

Ontwikkel algebraïese vergelykings wat vir jou 'n antwoord gee van:

a.

$$x = \frac{3}{4}$$

b.

$$x = \frac{1}{2}$$

c.

$$x = \frac{5}{2}$$

Los vergelykings op in die vorm: 'n produk van faktore is gelyk aan nul

Hersien die volgende:

$$x^2 + 6x + 8$$

		x^2			
				x^2	
				$4x$	8

$$2 \times 4 = 8$$

$$2 + 4 = 6$$

$$x + 2$$

x	x^2	$2x$
$+$		
4	$4x$	8

1. Faktoriiseer:

Voorbeeld: $x^2 + 5x + 6$
 $= (x+2)(x+3)$

a. $x^2 - x - 6 =$

b. $x^2 + 9x + 14 =$

$$\begin{aligned} x+1 &= 0 & x+3 &= 0 \\ x+1-1 &= 0-1 & x+3-3 &= 0-3 \\ x &= -1 & x &= -3 \end{aligned}$$

2. Los vir x op:

Voorbeeld $(x+1)(x+3) = 0$
 $x+1 = 0$ of $x+3 = 0$
 $x = -1$ of $x = -3$

a. $(x+2)(x+3) = 0$

b. $(x+4)(x-1) = 0$

3. Faktoriiseer:

Voorbeeld: $x^2 - 3x$
 $= x(x-3)$

a. $x^2 + 2x =$

b. $x^2 + 5x =$

4. Los vir x op:

Voorbeeld: $x^2 - 3x = 0$
 $= x(x-3) = 0$
 $x = 0$ of $x-3 = 0$
 $x = 0$ of $x = 3$

a. $x^2 + 2x = 0$

b. $x^2 - 6x = 0$

Hoekom is dit so belangrik om te weet hoe om 'n polinoom te faktoriiseer?

$$\begin{aligned} &= (x+5)(x-5) \\ &= x^2 + 5x - 5x - 25 \\ &= x^2 - 25 \end{aligned}$$

5. Faktoriiseer.

Voorbeeld: $x^2 - 25$
 $= x^2 - 5^2$

a. $x^2 - 36 =$

b. $x^2 - 16 =$

6. Bereken die vierkantswortel en gebruik die voorbeeld om positiewe en negatiewe getalle te toon.

Voorbeeld: $\sqrt{25}$
 $\sqrt{5 \cdot 5}$ of $\sqrt{-5 \cdot -5}$
 $= 5$ of -5

Hoekom is $\sqrt{25} = \sqrt{5 \cdot 5}$ of $\sqrt{-5 \cdot -5}$?

$$\begin{aligned} 5 \times 5 &= 25 \\ \text{en} \\ -5 \times -5 &= 25 \end{aligned}$$

a. $\sqrt{36}$

b. $\sqrt{16}$

7. Los vir x op.

Voorbeeld: $x^2 - 25 = 0$
 $x^2 = 25$
 $x^2 = 5^2$
 $\sqrt{x^2} = \sqrt{5^2}$
 $x = \pm 5$
 $x = +5$ of $x = -5$

Toets:
 $x^2 - 25 = 0$
 $(5)^2 - 25 = 0$
 $25 - 25 = 0$
 $0 = 0$

a. $x^2 - 49 =$






b. $x^2 - 36 =$

Probleemoplossing

Ontwikkel 'n som waar die produk van faktore gelyk is aan nul, en los dit dan op.

Konstrueer hoeke en poligone deur 'n gradeboog te gebruik

Hersien die volgende:

Stap 1: Trek 'n lynsegment. Merk dit AB. 	Stap 2: Sit die gradeboog so neer dat die oorsprong (klein gaatjie) oor punt A is. Roteer die gradeboog sodat die basislyn presies langs lyn AB is. 	Stap 3: Gebruik (in hierdie geval) die binneskaal en bepaal die gewenste hoek – hier 45° . 
Stap 4: Maak 'n merkie by hierdie hoek en verwyder die gradeboog. 	Stap 5: Gebruik 'n liniaal om 'n lyn A te trek na die merkie wat jy pas gemaak het. Merk hierdie punt C. 	Stap 6: Die lyn wat getrek is, vorm 'n hoek BAC met 'n meting van 45° . 

1. Konstrueer die volgende as 'n hersieningsaktiwiteit deur 'n gradeboog te A. Benoem die hoeke. Doen dit op 'n aparte vel papier of in 'n oefeningboek.

- a. Stomphoek b. Skerphoek c. Inspringende hoek
d. Reguit hoek e. Regte hoek f. Omwenteling

2. Noem al die belangrikste vorms van veelhoeke en driehoeke. Benoem die hoeke daarvan.

a. Veelhoek

b. Driehoek

3. Trek die volgende hoeke en poligone. Benoem dit.

a. 'n 60° -hoek.

b. 'n 270° -hoek.

c. 'n Driehoek met een 45° -hoek en een 65° -hoek.

d. 'n Driehoek met 'n 80° - en 35° -hoek.







e. 'n Vierhoek met een 70° -hoek en een 121° -hoek.

f. 'n Vierhoek met twee 85° -hoeke.

Probleemoplossing

Konstrueer die bo-aansig van 'n uiters moderne huis deur 'n gradeboog te gebruik.

Hersiening:

Om 'n sirkel akkuraat te trek, gebruik 'n passer.		Stel die potloodpunt gelyk met die passerpunt.		Skoef die potlood ook styf vas sodat dit nie uitglip nie.	
Mak seker dat die skarnier bo-op die passer vasgeskroef is sodat die passer nie gly nie.		Stel die passer op die radius van die sirkel. Die radius is die afstand tussen die middelpunt en die omtrek; dié is die helfte van die middellyn.		Druk die passerpunt vas en draai die knop aan die bokant van die passer om 'n sirkel te trek.	


1. Trek 'n sirkel. Gee 'n alledaagse voorbeeld van 'n sirkel van hierdie grootte.

a. met 'n radius van 1,8 cm.	Voorbeeld uit die alledaagse lewe:
b. met 'n middellyn van 3,2 cm.	Voorbeeld uit die alledaagse lewe:
c. met 'n radius van 16 mm.	Voorbeeld uit die alledaagse lewe:

2. Hersiening: Konstrueer loodregte lyne van albei kante af.


Stap 1

Trek 'n lyn en merk A en B daarop. Plaas die passerpunt op A en maak die passer oop sodat die potlood aan B raak. (Jy het dus die lengte van AB met die passer "gemeet".)




Stap 2

Los die passer se punt op A en maak met die passer 'n boog ongeveer twee derdes van die lyn se lengte.




Stap 3

Met die passer se breedte dieselfde, beweeg die passer punt na B en trek nog 'n boog wat die eerste boog by twee punte kruis. Benoem hierdie punte C en D.



Stap 4

Trek 'n lyn deur punte C en D wat die lyn AB by E halveer.



vervolg


Trek lyne wat loodreg is aan hierdie deur 'n gradeboog te gebruik.



3. Hersiening: Konstrueer 'n 45°-hoek op 'n aparte vel papier.



Stap 1

Volg die stappe om 'n loodregte lyn te trek.



Stap 2

Los die passerpunt op C en trek 'n boog met die passer wat ongeveer halfpad tussen C en B is. Plaas dit op B en trek 'n boog wat die eerste een kruis.



4. Gebruik jou kennis van hoe om 'n 45°-hoek te konstrueer om jou te help om hierdie hoeke te vorm.

a. 22,5°-hoek	b. 11,25°-hoek
c. 135°-hoek	d. 112,5°-hoek

Probleemoplossing

Wys in vier stappe hoe jy 'n 225°-hoek sal trek.

Wie konstrueer driehoeke in hul alledaagse lewe? Gebruik van die riglyne hierna.



'n Driehoek is 'n baie sterk struktuur. Die driehoek word in strukturele ontwerpe gebruik om gewig te versteek en te ondersteun.




Die regte driehoek is een van die belangrikste meerkundige figure en word al duisende jare lank in talloë toepassings gebruik.

1. Konstrueer $\triangle ABC$, waarin $AB = 5$ cm, $AC = 3,5$ cm en $BC = 4$ cm. Volg die stappe.

Hoe om 'n driehoek te konstrueer as drie sye gegee word (SSS).

Stap 1: Trek $AB = 5$ cm.	Stap 2: Trek 'n boog, met A as middelpunt en radius $3,5$ cm.	
Stap 3: Trek nog 'n boog, met B as middelpunt en radius 4 cm, wat die boog van C sny.	Stap 4: Verbind AC en BC.	




Oefen:

2. Konstrueer $\triangle CDE$, waarin $CD = 2,5$ cm, $DE = 4,2$ cm en $CE = 3,6$ cm.

3. Konstrueer 'n driehoek ABC, waarin $AB = 5,5$ cm, $BC = 4,5$ cm en $\angle ABC = 60^\circ$.

Hoe om 'n driehoek te konstrueer as twee sye en die ingeslote hoek gegee word (SAS).

Stap 1: Trek $AB = 5,5$ cm.	Stap 2: Konstrueer 'n hoek $ABX = 60^\circ$ by B.	
Stap 3: Trek 'n boog, met B as middelpunt en radius $4,5$ cm, wat BC by C sny.	Stap 4: Verbind AC. $\triangle ABC$ is dan die verlangde driehoek.	



Let wel. Jy kan $BC = 4,5$ cm as die basis neem in plaas van AB .

Oefen:


vervolg

4. Konstrueer 'n driehoek DEF, waarin $DE = 3,7$ cm, $EF = 41$ mm en $\angle DEF = 55^\circ$.

5. Konstrueer 'n $\triangle ABC$, waarin $\angle A = 60^\circ$, $\angle B = 45^\circ$ en $AB = 4,5$ cm.

Hoe om 'n driehoek te konstrueer as twee hoeke en die ingeslote sy gegee word (HSH).

Stap 1: Trek $AB = 4,5$ cm.	Stap 2: Konstrueer $\angle BAX = 60^\circ$ by A.	
Stap 3: Konstrueer $\angle ABY = 45^\circ$ by B, met BY wat AX by C kruis.	$\triangle ABC$ is dan die verlangde driehoek	




6. Konstrueer 'n $\triangle KLM$, waarin $\angle K = 48^\circ$, $\angle L = 48^\circ$ en sy $KL = 3,9$ cm.

Oefen:

7. Konstrueer 'n regte driehoek ABC wat reghoekig by B is, met sy $BC = 4$ cm en skuinssy $AC = 6$ cm.

Hoe om 'n regte driehoek te konstrueer as die skuinssy en 'n sy daarvan gegee word.

Stap 1: Trek $BC = 4$ cm.	Stap 2: Konstrueer $\angle CBP = 90^\circ$ by B.	
Stap 3: Trek 'n boog, met C as middeelpunt en radius 6 cm, wat BP by A sny.	Stap 4: Verbind AC.	



Oefen:


8. Konstrueer 'n regte driehoek XYZ, wat reghoekig is by Y, met sy $YZ = 5$ cm en skuinssy $XZ = 7$ cm.

Probleemoplossing

Konstrueer 'n gelykbenige driehoek.

Konstruering van vierhoeke (tetragone)

Hoe het die ontwerpers van hierdie kamers vierhoeke gebruik?




1. Konstrueer 'n reghoek ABCD waar $AB = 4$ cm en $AC = 5$ cm.

Hoe om 'n reghoek te konstrueer as een van sy diagonale en 'n sy gegee word.

Stap 1: Trek $AB = 4$ cm.	Stap 2: Trek $\angle ABQ = 90^\circ$ by B.
Stap 3: Trek 'n boog, met A as middelpunt en radius 5 cm, wat BQ by C sny.	Stap 4: Trek 'n boog, met C as middelpunt en radius 4 cm.
Stap 5: Trek 'n boog, met A as middelpunt en radius = BC, wat die boog, wat in stap 4 getrek is, by D sny.	Stap 6: Verbind DC en AD.

Onthou dat 'n vierhoek elke hoek 90° is.



Oefen:


vervolg

2. Konstrueer 'n reghoek KLMN, waarin $KL = 3,6$ cm en $KM = 4,5$ cm.

3. Konstrueer 'n vierkant ABCD waarin $AB = 4,5$ cm.

Hoe om 'n vierkant te konstrueer as die sy daarvan gegee word.

Stap 1: Trek $AB = 4,5$ cm.	Stap 2: Konstrueer $\angle ABQ = 90^\circ$ by B.
Stap 3: Sny $BC = 4,5$ cm van BQ af.	Stap 4: Trek twee boë met radiusse van 4,5 cm elk vanaf A en C om mekaar by D te sny.
Stap 5: Verbind AD en CD.	



Oefen:

vervolg


4. Konstrueer 'n vierkant GHIJ, waarin $GH = 32 \text{ mm}$.




5. Konstrueer 'n parallellogram waarvan die aangrensende sye 5 cm en 3 cm en die ingeslote hoek 60° is.

Hoe om 'n parallellogram te konstrueer as twee aangrensende sye en die ingeslote hoek gegee word.

Stap 1: Trek $AB = 5 \text{ cm}$.	Stap 2: Konstrueer $\angle BAQ = 60^\circ$ by A.
Stap 3: Sny $AD = 4 \text{ cm}$ van AQ af.	Stap 4: Trek twee boë, met B en D as middelpunte en radiusse gelyk aan onderskeidelik 4 cm en 5 cm , wat mekaar by C sny.
Stap 5: Verbind CD en BC.	



Oefen:




6. Konstrueer 'n parallellogram waarvan die aangrensende sye 6 cm en 3 cm en die ingeslote hoek 60° is.




7. Konstrueer 'n rombus as een diagonal 5 cm en die sy 3 cm is.

Hoe om 'n rombus te konstrueer as een diagonal en sy gegee word.

Stap 1: Trek $AC = 5 \text{ cm}$	Stap 2: Met A as middelpunt en radius 3 cm , trek twee boë – een bo AC en een onder AC.
Stap 3: Met C as middelpunt en radius 3 cm , trek twee boë – die een bo AC en die ander een onder AC waar die boë van stap 2 mekaar sny in B en D onderskeidelik.	Stap 4: Verbind AB, BC, CD en AD



8. Konstrueer 'n rombus as een van sy diagonal 4 cm en die sy 3 cm is.



Trek drie voorbeelde elk van reëlmatige en onreëlmatige poligone. Onthou om jou poligone te benoem.



As al die hoeke gelyk is en al die sye gelyk is, dan is dit 'n **reëlmatige** poligoon.

As die hoeke en die sye nie gelyk is nie, dan is dit 'n **onreëlmatige** poligoon.



Die grootte van die binnehoeke van reëlmatige veelhoeke is gegee. Met onreëlmatige veelhoeke kan jy voorbeelde gee.

1. Voltooi die tabel:

Poligoon	Totale aantal sye	Hoekgroottes	Totaal:
Reëlmatige driehoek	3	$60^{\circ} + 60^{\circ} + 60^{\circ}$	180°
Onreëlmatige driehoek			
Reëlmatige vierhoek			
Onreëlmatige vierhoek			
Reëlmatige vyfhoek			
Onreëlmatige vyfhoek			
Reëlmatige seshoek			
Onreëlmatige seshoek			
Reëlmatige sewehoek			
Onreëlmatige agthoek			
Reëlmatige negehoek			
Onreëlmatige negehoek			
Reëlmatige tienhoek			
Onreëlmatige tienhoek			

2. Wat is dit dié? Watter poligoon (poligone) kan jy identifiseer? Beskryf die poligone.



3. Kyk na die kameelperd. Identifiseer al die reëlmatige en onreëlmatige poligone daarop. Beskryf dit.






4. Watter tipe kuns is dit dié? Identifiseer al die meerkundige figure. Beskryf elkeen.




Probleemoplossing

Konstrueer 'n onreëlmatige sesienhoek (heksadekagoon). Meet al die hoeke.

Hoe om 'n seshoek te konstrueer.

Stap 1: Trek 'n sirkel. Hou die passer op dieselfde radius. 	Stap 2: Gebruik 'n passer en maak merktes, wat ewe ver van mekaar is, op die omtrek. 	Stap 3: Benoem die punte en verbind dit dan. 
---	--	--

Identifiseer die seshoeke en verduidelik hoe dit gebruik word.



1. Konstrueer 'n seshoek en benoem die hoekpunte A tot F.

a. Is dit 'n reëlmatige of onreëlmatige seshoek? Hoekom?

b. Wat is die lengte van die sye? Hoe sal jy dit met behulp van 'n passer meet?

c. Wat is die groottes van die hoeke? Hoe sal jy dit (i) sonder 'n gradeboog en (ii) met 'n gradeboog bepaal?








d. Wat is die afstand vanaf AD, FC, of BE? Wat is hierdie van die sirkel?

e. Wat is die verhouding tussen AD en AB?

2. Konstrueer 'n reëlmatige seshoek, waar die sye 3,2 cm is.

Probleemoplossing

Konstrueer 'n twaalfhoek deur middel van 'n soortgelyke metode as wat in hierdie werkblad gebruik word.

Stap 1: Trek 'n sirkel met radius AB om A. 	Stap 2: Trek 'n sirkel met radius AB om B. Noem die snypunt C en D. 	Stap 3: Trek 'n sirkel met radius DA om D. Sirkel D sny lyn CD by E. 
Stap 4: Sirkel D sny sirkel A by F en sny sirkel B by G. 	Stap 5: Trek 'n lyn deur FE en 'n lyn deur GE. Lyn FE sny sirkel B by H. Lyn GE sny sirkel A by I. 	Stap 6: Stel jou passer om so lank soos AI te wees. Plaas die passerpunt op I en trek 'n klein bogie bo C. Plaas dan jou passerpunt op H en trek 'n boog wat die eerste boog kruis. Benoem die snypunt J. 
Stap 7: Al die punte A, B, I, H, J en I is punte van die vyfhoek. Verbind hulle. 		

1. Konstrueer 'n vyfhoek en benoem die hoekpunte daarvan A, B, H, J en I.

2. Beantwoord die volgende:

a. Voltooi die volgende: $JH = \text{---} = \text{---} = \text{---} = \text{---}$

b. Is die vyfhoek reëlmatig of onreëlmatig? Hoekom?

c. Beskryf AB, DA en DB.

3. Trek 'n reëlmatige vyfhoek met sye wat gelyk is aan 2,3 cm.

Probleemoplossing

Skryf stap vir stap neer hoe jy 'n vyfhoek sal konstrueer deur 'n gradeboog te gebruik.

1. Konstrueer nou self 'n agthoek.

2. Vultooi die volgende:

$$a \cdot OA = \frac{a}{\sin A} = \frac{a}{\cos B} = \frac{a}{\sin C} = \frac{a}{\cos D} = \frac{a}{\sin E} = \frac{a}{\cos F}$$

b. Wat is hierdie van die sirkel?

$$c, AE = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

d. Wat is hierdie van die sirkel?

3. Trek 'n reëlmattige agthoek met gelyke radiusse van 2,8 cm.


Problemoplossing

Skryf stap vir stap neer hoe jy 'n agthoek sal konstrueer deur 'n gradeboog te gebruik.


Hoe word agthoeke gebruik?




Stap 1: Teken 'n sirkel met middelpunt O en middellyn AOB.




Stap 2: Teken nog 'n middellyn COD, loodreg aan AOB.




Stap 3: Halveer die rechte hoek AOC en die rechte hoek BOD.



Stap 4: Halveer die rechte hoek COB en AOD.



Step 5: Verbind al die kruispunte op die omtrek van die sirkel met reguit lyne om die agthoek (oktagoon) te vorm.



Hersien: Daar is spesiale name vir driehoeke in ooreenstemming met:

Sye		Hoeke
Gelyksydige		Skerphoek: Alle hoeke is minder as 90° .
Gelykbenige		Regte hoek: Dit het 'n regte hoek (90°).
Ongelykbenige		Stomphoek: Dit het 'n hoek van meer as 90° .

1. Lees die volgende en benoem die driehoek.

Bewys dat: $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$

Konstruksie: Trek 'n lyn DAE deur A wat parallel aan BC is.

Bewys: Aangesien DE parallel aan BC is en AB 'n snylyn is

$\therefore \angle B = \angle DAB$ (paar verwisselende hoeke)

Net so $\angle C = \angle EAC$ (paar verwisselende hoeke)

$\therefore \angle B + \angle C = \angle DAB + \angle EAC$ (twee pare verwisselende hoeke)


Nou $\angle A + \angle DAB + \angle EAC = 180^\circ$ (reguitlyn)

en omdat $\angle DAB + \angle EAC = \angle B + \angle C$


$\therefore \angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$

Die som van die drie hoeke van 'n driehoek is 180° .

Versoek jou onderwyser om verwisselende snylyne saam met jou te bereken.




2. Die som van die drie hoeke van 'n driehoek is 180° .




3. Bereken en konstrueer hierdie driehoeke. Klassifiseer elke driehoek. Let op dat jou antwoorde en konstruksies kan verskil van dié van jou klasmaats.


a. $\angle A + \angle B + 90^\circ = 180^\circ$




b. $\angle A + 45^\circ + \angle C = 180^\circ$




c. $100^\circ + \angle B + \angle C = 180^\circ$




d. $\angle A + 65^\circ + \angle C = 180^\circ$



e. $\angle A + 60^\circ + \angle C = 180^\circ$



f. $120^\circ + \angle B + \angle C = 180^\circ$





Probleemoplossing

As een hoek van 'n driehoek gelyk is aan 45° , wat kan die groottes van die ander hoeke wees? Gee vyf verskillende moontlikhede.

Simbole in meetkunde. Identifiseer simbole wat ons gebruik wanneer ons met driehoeke werk. Gee 'n rede vir elke simbool.

Driehoek	Hoek	Loodregte	Parallele	Grade	Regte hoek
Lynsegment $\overline{AB}$	Lyn $\overleftrightarrow{AB}$	Halfstraal $\overrightarrow{AB}$	Kongruente 	Gelyksoortige 	Dus

1. Meet die sye van die driehoeke. Benoem die driehoeke en beskryf dit dan.



Dink aan woorde soos
tipes driehoeke,
kongruent,
transformasies, en
dies meer.

2. Wat beteken hierdie simbole?

$\triangle ABC$

$\overline{AB} = \overline{AC}$

$\angle ABC = \angle ACB$

3. Teken 'n gelykbenige driehoek en dui aan hoe jy dit na 'n gelyksydige driehoek sal verander. Etiketteer jou tekeninge met die toepaslike geometriese simbole.

4. Wat beteken hierdie simbole?

$\triangle ABC$

$\overline{AB} \neq \overline{AC} \neq \overline{BC}$


$\angle ABC \neq \angle ACB \neq \angle BAC$

5. Skryf die simbole neer wat toon wat gebeur het wanneer jy 'n ongelyksydige driehoek na 'n gewone driehoek verander.

6. a. Konstrueer en benoem 'n reghoekige driehoek.

b. Verander die onreëlmatige driehoek in 6.a. in 'n reëlmatige driehoek.

7. Kyk na die diagram en voltooi dan die vrae.




a. Wat is dit dié?

vervolg

- b. Waar sal jy 'n voorbeeld van hierdie vorm in die natuur vind? _____
- c. Watter tipe driehoeke is dit? _____
- d. Is die driehoeke reëlmatig of onreëlmatig? _____
- e. Kan ek hierdie driehoeke in kleiner driehoeke verdeel? _____
- f. Watter tipe driehoeke sal dit vorm? _____

8. Kyk na die patrone in hierdie brandskilderglasvenster.



Sien jy enige driehoeke raak? Sien jy enige onreëlmatige meetkundige vorms?


9. Kies die regte antwoord en maak 'n merkie (✓) langs die antwoord:

- a. Watter van die volgende kan die hoeke van 'n driehoek wees?
- 65° , 45° en 80°
 - 90° , 30° en 61°
 - 60° , 60° en 59°
 - 60° , 60° en 60°
- b. Die skuinsy van 'n driehoek is:
- Die sy wat teenoor die regte hoek in 'n reghoekige driehoek staan.
 - Die sy langs die regte hoek in 'n reghoekige driehoek.
 - Die hoek van 'n reghoekige driehoek.
 - Al drie sye van 'n reghoekige driehoek.
- c. 'n Gelyksydige driehoek:
- Twee sye is gelyk.
 - Al die sye is gelyk, maar nie die hoeke nie.
 - Al die sye en die binnehoeke is gelyk.
 - Al die hoeke is gelyk, maar nie die sye nie.
- d. 'n Gelykbenige driehoek:
- Al die sye is gelyk.
 - Minstens twee sye is gelyk en die basishoeke daarvan is gelyk.
 - Minstens twee sye is gelyk, maar geen hoeke is gelyk nie.
 - Twee hoeke is gelyk, maar geen sye is gelyk nie.
- e. 'n Reghoekige driehoek:
- Geen hoeke is regte hoeke nie.
 - Al die hoeke is 60° .
 - Twee hoeke is 90° .
 - Een hoek is 'n regte hoek.
- f. 'n Reghoekige driehoek:
- Geen hoeke is regte hoeke nie.
 - Alle hoeke is 60° .
 - Twee hoeke is 90° .
 - Een hoek is 'n regte hoek.


Probleemoplossing

Maak jou eie brandskilderglaspatroon. Jy moet soveel onreëlmatige driehoeke moontlik gebruik.

Praat oor hierdie vloeidiagram.




1. Gebruik die simbole en kleure om die vrae te beantwoord. Plak of teken prente van alledaagse voorbeelde langs elkeen of op 'n aparte stukkie papier.



2. Konstrueer 'n vlieër, benoem dit en verdeel dit in twee driehoeke. Is hierdie driehoeke reëlmatig of onreëlmatig?

3. Verdeel 'n trapesium in onreëlmatige driehoeke. Benoem dit.

4. Identifiseer die reëlmatige en onreëlmatige poligone in hierdie mosaiek en benoem dit dan.




Probleemoplossing

Ontwerp 'n mosaiekpatroon (jy kan ou stukkie papier gebruik) deur verskillende tipes poligone te gebruik.


Wat is 'n tangram?

Die **tangram** is 'n diseksielegkaart wat bestaan uit sewe plat vorms, wat stukke genoem word en wat saamgepak word om vorms te skep. Die doel van die legkaart is om 'n spesifieke vorm te skep deur al sewe stukke, wat mekaar nie mag oorleuel nie, te gebruik. Dit is oorspronklik in China uitgevind.




- Maak meerkundige vorms deur al die stukke van die tangram (Knipselblad 1) te gebruik. Maak 'n skets daarvan binne-in die antwoordraam en sê of dit 'n reëlmatige of onreëlmatige vorm is. Benoem die vorms van die onderdele daarvan. Ons het die eerste een vir jou gedoen.


- Maak 'n groot vierkant.




- Maak 'n reghoek.




- Maak 'n parallelogram.




- Maak 'n trapesium.



- Maak enige ander tetragoon.





- Voltooi die tabel:




Meetkundige figuur	Watter breuk van die vierkant is dit?	Benoem die vorm.	Is die vorm reëlmatig of onreëlmatig?
a. AOD			
b. ADB			
c. OGFI			


3. Kyk na die vorms hieronder. Wat is die verskille en ooreenkomstige tussen die poligone?




Vierkant




Pentagoon




Driehoek




Trapeesium




Parallelogram



Oktagoon




Heksagoon




Reghoek


4. Is die volgende vorms veelhoeke? Indien wel, is hulle reëlmatig of onreëlmatig? Gee redes vir jou antwoord.







i.



ii.




iii.






iv.



v.



vi.




Probleemoplossing

Mak enige ander poligoon deur al sewe tangramstukke te gebruik. Trek die poligoon en beskryf dit.

Wat is gelyksoortigheid?

Gelyksoortige driehoeke het die volgende eienskappe:

Simbool vir gelyksoortigheid:
Hierdie driehoeke is gelyksoortig:



- Elke ooreenstemmende paar hoeke is gelyk.
- Die verhouding van enige paar ooreenstemmende sye is dieselfde.
- Dit het dieselfde vorm maar nie dieselfde grootte nie.

Ons kan sien of twee driehoeke gelyksoortig is sonder om al die sye en al die hoeke van die twee driehoeke te toets.

Daar is twee reëls waarvolgens gelyksoortige driehoeke uitgekien kan word. Dit word die **HH-reël** en die **VHV-reël** genoem.



Solank as wat een van die reëls geld, is dit voldoende om te bewys dat die twee driehoeke gelyksoortig is.

1. Gegewe die volgende driehoeke, vind die lengte van sy a.

HH-reël

As twee hoeke van een driehoek gelyk is aan twee hoeke van 'n ander driehoek, dan is die driehoeke gelyksoortig.

a.



Oplossing:

Stap 1: Die driehoeke is gelyksoortig vanweë die ____-reël.

Stap 2: Die verhoudings van die lengtes is gelyk. $\frac{6}{2} = \frac{9}{a}$

Stap 3: Maak gebruik van kruisvermenigvuldiging om te vereenvoudig.



'n Verhouding toon die relatiewe groottes van twee of meer waardes. Voorbeeld: 2:3

Hier is 'n voorbeeld van kruisvermenigvuldiging:
 $\frac{2}{3} = \frac{4}{x}$
 $2x = 12$
 $x = 6$

VHV-reël

As die hoek van een driehoek dieselfde is as die hoek van 'n ander driehoek en die sye wat hierdie hoeke bevat, in dieselfde verhouding is, dan is die driehoeke gelyksoortig.

b.



Oplossing:

Stap 1: Die driehoeke is gelyksoortig vanweë die ____-reël.

Stap 2: Die verhoudings van die lengtes is gelyk.

Stap 3: Die lengte van a is:





Gelyksoortige driehoeke vervolg



51b

2. Bepaal die lengte van sy a. Dui die reël aan wat jy gebruik.



a.





b.





c.



d.



3. Is dit gelyksoortige figure? Verduidelik jou antwoord.



Probleemoplossing

Soek na twee figure in jou alledaagse lewe wat gelyksoortig is. Konstrueer dit.

Kongruente driehoeke is driehoeke wat dieselfde grootte en vorm het. Dit beteken dat die ooreenstemmende sye gelyk is en dat die ooreenstemmende hoeke gelyk is.




- Die ooreenstemmende sye is: AB en DE, AC en DF, en BC en EF.
- Die ooreenstemmende hoeke is: x en r , y en s , en z en t .
- Daar is vyf reëls om kongruente driehoeke te identifiseer.
- Hierdie is die reëls: **SSS**, **SHS**, **HSH**, **HHS** en **RSS**.

1. Bespreek hierdie reëls en trek voorbeelde daarvan:

SSS-reël (Sy – Sy – Sy)


As drie sye van een driehoek gelyk is aan drie sye van 'n ander driehoek, dan is die driehoeke kongruent.



- a. Trek kongruente driehoeke deur die SSS-reël te gebruik. Dui die lengte van die sye van die driehoeke aan.

SHS-reël (Sy – Hoek – Sy)


As twee sye en die ingeslote hoek van een driehoek gelyk is aan twee sye en die ingeslote hoek van 'n ander driehoek, dan is die driehoeke kongruent.



- b. Trek kongruente driehoeke deur die SHS-reël te gebruik. Dui die lengte van die driehoeke se sye aan.

HSH-reël (Hoek – Sy – Hoek)


As twee hoeke en die ingeslote sy van een driehoek gelyk is aan twee hoeke en die ingeslote sy van 'n ander driehoek, dan is die driehoeke kongruent.



- c. Trek kongruente driehoeke deur die HSH-reël te gebruik. Dui die lengte van die sye van die driehoeke aan. Trek kongruente driehoeke met behulp van die HSH-reël. Toon die lengte van die sye van die driehoeke.

HHS-reël (Hoek – Hoek – Sy)


As twee hoeke en 'n nie-ingeslote sy van een driehoek gelyk is aan ooreenstemmende twee hoeke en 'n nie-ingeslote sy van 'n ander driehoek, dan is die driehoeke kongruent.



- d. Trek kongruente driehoeke deur die HHS-reël te gebruik. Dui die lengte van die sye van die driehoeke aan.

RSS-reël (Regte hoek – Skuinssy – Sy)


As die skuinssy in 'n reghoeke driehoek en een ander sy gelyk is aan die skuinssy en ooreenstemmende sy in 'n ander driehoek, dan is beide driehoeke kongruent.



- e. Trek kongruente driehoeke deur die RSS-reël te gebruik. Dui die lengte van die skuinssy aan as die twee ander sye 3 cm en 4 cm lank is.



2. Watter van die volgende voorwaardes sou vir die driehoeke hieronder voldoende wees om kongruent te wees? Gee 'n verduideliking vir elkeen.



- a. $a=d$, $x=r$, $b=e$



- b. $a=d$, $y=s$, $z=t$



- c. $c=f$, $y=t$, $b=e$







- d. $a=e$, $y=t$, $z=s$



3. Dui aan of die volgende pare driehoeke kongruent is.

As dit is, gee 'n rede vir jou antwoord deur die SSS-, HSH-, SHS-, SHH- of RSS-reëls te gebruik.

**Probleemoplossing**

Soek na enige kongruente vorms in die natuur en maak 'n skets daarvan.

Beskou hierdie prente en identifiseer al die lyne en hoeke.



Watter impak het perspektief op die 2de en die 3de prent?

Woorde wat jou kan help:

- Lyn
- Lynsegment
- Halflyn (straal)
- Loodregte lyne
- Parallele lyne
- Hoek
- Skerphoek
- Regte hoek
- Stomphoek
- Reguitlyn
- Inspringende hoek

1. Benoem hierdie simbole wat jy gebruik as jy met hoeke en lyne werk.

$\triangle$	$\angle$	$\perp$	$\parallel$	$\circ$	$\bot$
$\overline{AB}$	$\overleftrightarrow{AB}$	$\overrightarrow{AB}$	$\cong$	$\sim$	$\therefore$

a. Sê hoekom jy hierdie sal gebruik:

b. Sê hoekom jy hierdie nie sal gebruik nie:

2. Wat het ons gehelp om hierdie lyn te trek?

Trek die volgende lyne.

Gee die koördinate vir enige ander punt op hierdie lyn.


a. (1,1) en (3,3)

b. (2,7) en (5,5)


c. (6,5) en (7,6)

d. (4,1) en (7,3)

e. (1,4) en (3,4)



3. Gebruik die grafiek om die vrae te beantwoord.



a. Hoekom is lyn $x = 4$ 'n vertikale lyn?

b. Wys dit op die grafiek.

c. Hoekom is lyn $y = 3$ 'n horisontale lyn?

d. Wys dit op die grafiek.

e. Waar sal hierdie twee lyne loodreg teenoor mekaar wees?


f. Trek 'n lyn wat parallel is aan die lyn in a. ($x = 4$) en trek dan 'n lyn wat parallel is aan die lyn in c. ($y = 3$). Beskryf dit.

4. Wat is 'n ander naam vir 'n 180° -hoek?

5. Gee 'n beskrywing van elkeen van die volgende woorde: skerp, stomp, regte en inspringende. Waar kan ons hierdie hoeke in ons alledaagse lewe aantref? Watter een word die algemeenste gebruik?

Probleemoplossing

Wees kreatief en skryf 'n paragraaf oor hoe die wêreld sonder lyne en hoeke daar sou uitsien.



1. Trek die volgende hoeke en sê of dit komplementêre of supplementêre hoeke is. Bepaal die grootte van die hoek van 'n onbekende grootte.

a. $\angle 1 + 30^\circ = 90^\circ$

b. $48^\circ + \angle 2 = 180^\circ$



c. $\angle 1 + \angle 2 = 90^\circ$

d. $\angle 1 + 100^\circ = 180^\circ$

e. $36^\circ + \angle 2 = 90^\circ$

f. $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$


2. Kyk na hierdie prent van dwarsbalke. Identifiseer en benoem die komplementêre en supplementêre hoeke.




3. Trek vyf verskillende pare van komplementêre hoeke en benoem dit.



4. Trek vyf verskillende pare van supplementêre hoeke en benoem dit.




5. Soek na enige komplementêre en supplementêre hoeke in jou alledaagse omgewing. Trek hierdie hoeke en benoem dit.



Probleemoplossing

Kan twee stomp hoeke komplementêr wees? Kan dit supplementêr wees? Verduidelik.

Snylyne is reguitlyne wat oor ander (gewoonlik parallelle) reguitlyne sny. Hoekom is baie hoeke dieselfde in hierdie skets van 'n snylyn wat twee parallelle lyne kruis?



Parallelle lyne

Snylyn

Hierdie hoeke kan in pare hoeke verander word wat dieselfde name het.

Verikaal teenoorstaande hoeke:

$a = d$; $b = c$; $e = h$; $f = g$

Ooreenstemmende hoeke:

$a = e$; $b = f$; $c = g$; $d = h$

Verwisselende binne-hoeke


$c = f$; $d = e$

Verwisselende buite-hoeke


$a = h$; $b = g$

Opeenvolgende (of ko-) binnehoeke

$c + e = 180^\circ$; $d + f = 180^\circ$



1. Meet elke hoek.



a. Bepaal al die verikaal teenoorstaande hoeke. Skryf dit neer.


b. Bepaal al die ooreenstemmende hoeke. Skryf dit neer.

c. Bepaal al die verwisselende hoeke. Skryf dit neer.



d. Bepaal die ko-binnehoeke. Skryf dit neer.

e. Hoekom is hoeke 2 en 7 gelyk?


2. Identifiseer en merk die verikaal teenoorstaande hoek.



b.




c.





d.

3. Identifiseer en merk die ooreenstemmende hoek.




a.

b.




c.



d.




4. Identificeer en merk die verwisselende hoek.



ॐ




٧




८.


5. Identificeer al die hoeke wat gelyk is aan die een wat gemerk is.




८५

o

١


 $\dot{r}$

6. Hoe sou jy elke hoek uitwerk as hoek 1 gegee is?




Probleemoplossing

As $\angle 1 = 105^\circ$, wat kan die grootte van $\angle 2$ tot 8 dan wees?



Beskou hierdie foto en bespreek dit.



1. Gebruik die kennis wat in vorige werkblaaie verwerf is om hoek BCD, CDB, DBC, ABD, BDE en BAE uit te werk. Jy kan die hoeke in enige volgorde van jou keuse uitwerk. Hoek BCD is 'n gelykhoekige driehoek. Hoek AED is 'n regte hoek.

2. Ontwikkel 'n soortgelyke "wipwaentjie"-probleem. Probeer om al die konsepte te gebruik wat jy tot dusver geleer het. Konstrueer en teken of plak jou prent hier.

- Konsepte wat gebruik kan word wanneer jy probleme ontwikkel:
- Paralelle lyne
 - Snylyn
 - Verlikaal teenoorstaande hoeke
 - Ooreenstemmende hoeke
 - Verwisselende buitehoeke
 - Opeenvolgende binnehoeke

Probleemoplossing

Los die probleem in vraag 2, wat jyself ontwikkel het, saam met 'n familielid op.


Om hierdie werkblad te kan verstaan, moet jy die volgende konsepte ken. Hersien jou kennis daarvan deur 'n definisie vir elkeen te skryf.

Kongruensie	Translasie
'n Lyn	Rotasie
Om te stip	Refleksie

Jy moet hier terugdink aan wat jy in graad 8 gedoen het.



1. Vollooi die volgende:




- Stip (2,5), (6,5), (2,9) en (6,9) op die rooster.
- Verbind hierdie punte. Watter meetkundige figuur word so gevorm?
- Benoem die hoekpunte A, B, C, D.
- Trek 'n lyn EF van (1,10) na (7,4).
- Waarín word jou meetkundige figuur nou gedeel?

f. Wat is die hoeke se groottes?

g. Is die twee figure kongruent aan mekaar en hoekom?

2. Voltooi die volgende:



a. Stip (1,9), (9,9) en (5,5). Verbind die punte. Verbind hulle en benoem die hoekpunte. Watter meetkundige figuur word gevorm?

b. Stip (1,1). Kan jy 'n ander meetkundige figuur vorm wat **kongruent** is aan die vorm in vraag 2a, deur die bestaande punte te gebruik?


c. Stip (5,1) en (3,3). Gebruik hierdie punte om 'n figuur te trek wat **gelyksoortig** is aan die figuur in vraag 2a en 2b.

Toepassing van meetkundige figure en lyne vervolg

- d. Plot (7,7) en (7,3). Trek lyne van (7,7) tot (7,3), van (7,3) tot (5,1) en van (7,3) tot (5,5). Watter geometriese figure het dit gevorm? Is hierdie geometriese figure kongruent aan enige ander vorms?

- e. Stip (7,7). Trek 'n lyn van (7,7) na (7,3). Watter meetkundige figuur word gevorm? Is hierdie meetkundige figuur kongruent aan enige ander vorm?

3. Ons kry dikwels kongruente meetkundige figure in die natuur en in kuns. Identifiseer sulke vorms in die prente.




- a. Skryf in jou eie woorde wat translasië beteken.

- b. Kyk na die foto van die skoenlapper. Identifiseer die kongruente vorms. Wat merk jy op omtrent die vorms as jy dit met die vorms op die slang vergelyk?

- c. Kyk na wat die juwele-ontwerper gemaak het. Identifiseer al die kongruente vorms. Watter tipe transformasies is gemaak?


4. Trek kongruente figure op hierdie grafiek. Gebruik die kleure wat vir elke figuur aangedui is: translasië (swart), refleksië (blou) en rotasie (rooi).



Probleemoplossing


Bespreek vraag 3 met 'n familielid.

Hersien Pythagoras se stelling. Omtrent 2 500 jaar gelede het 'n man met die naam van Pythagoras 'n ongelooflike feit oor driehoeke ontdek. Kan jy nog onthou wat dit was?



- Wat is die grootte van blok A? (4^2)
- Wat is die grootte van blok B? (3^2)
- Wat is die grootte van blok C? (5^2)
- Wat kan jy opmerk?

1. Skryf 'n getaltesin vir die volgende en los dit op.




2. Hier is die lengtes van die sye van 'n paar reghoekige driehoeke. Maak sketse om te wys dat die oppervlakte van die vierkant wat op die langste sy van elke reghoekige driehoek getrek is, gelyk is aan die totale oppervlakte van die vierkante wat op die ander twee sye getrek is. Jy moet baie mooi hieroor nadink. Jy sal ekstra papier nodig hê.

	Sy	Sy	Sy
a.	6	8	10
b.	15	25	20
c.	45	36	27
d.	20	12	16
e.	9	15	12

3. Skryf 'n vergelyking vir die volgende neer en bereken elke sy:

Voorbeeld




$$4^2 + 3^2 = 5^2$$


$$16 + 9 = 25$$

$$25 = 25$$

a.




b.




4. Skryf 'n vergelyking vir elkeen van die volgende neer:

Voorbeeld


$$a^2 + b^2 = c^2$$




a.




b.



c.




d.




5. Bepaal die lengtes van die onbekende sye in die volgende reghoekige driehoeke. Jy mag 'n sakrekenaar gebruik.

Voorbeeld


$$\begin{aligned} x^2 &= (3 \text{ cm})^2 + (4 \text{ cm})^2 \\ x^2 &= 9 \text{ cm}^2 + 16 \text{ cm}^2 \\ x^2 &= 25 \text{ cm}^2 \\ x^2 &= \sqrt{25 \text{ cm}^2} \\ x &= 5 \text{ cm} \end{aligned}$$




a.




b.



c.




d.



Probleemoplossing


- Gee twee voorbeelde van waar ons Pythagoras in ons alledaagse lewe kan gebruik.
- Themba loop soos daar in die diagram gewys word. Hy beweeg 145 m noord en 50 m wes van die beginpunt af. Hoe ver is Themba nou van die beginpunt af?



Meer omtrent die stelling van Pythagoras

59a


Lees die gesprek tussen hierdie twee bouers.



Dit is om te verseker dat die hoeke van die huis vierkantig sal wees.


1. Bepaal die lengte van die reghoek se diagonaal.

Voorbeeld




$$\begin{aligned}x^2 &= (3 \text{ cm})^2 + (4 \text{ cm})^2 \\x^2 &= 9 \text{ cm}^2 + 16 \text{ cm}^2 \\x^2 &= 25 \text{ cm}^2 \\x^2 &= \sqrt{25 \text{ cm}^2} \\x &= 5 \text{ cm}\end{aligned}$$


a.




b.



c.




d.




2. Bepaal die lengte van die reghoek se diagonaal.

Voorbeeld





$$\begin{aligned}x^2 &= (5 \text{ cm})^2 + (8 \text{ cm})^2 \\x^2 &= 25 \text{ cm}^2 + 64 \text{ cm}^2 \\x^2 &= 89 \text{ cm}^2 \\x^2 &= \sqrt{89 \text{ cm}^2} \\x &= 9,40 \text{ cm}\end{aligned}$$

a.




b.




Meer omtrent die stelling van Pythagoras vervolg

59b

c.




d.




3. Bepaal die onbekende sy op elkeen van hierdie gelykbenige driehoeke.


a.




b.



c.




d.



Probleemoplossing

a. Lindiwe het haar leer teen die muur laat rus. Hoe ver strek die leer teen die muur op?



b. 'n Driehoekige gebied word geteël. Die sye van die oppervlakte is 8 cm, 12 cm en 18 cm. Is hierdie 'n reghoekige driehoek? Verduidelik jou antwoord.








Omtrek van 'n vierkant en reghoek; oppervlakte van 'n vierkant en reghoek

Wat beteken hierdie formules? Verbind dit met die woorde aan die regterkant.

$P = 4s$
 $P = 2(l + w)$ of $P = 2l + 2w$
 $A = l^2$
 $A = l \times w$
 $W = \text{Wydte} = \text{Breedte} = B$

omtrek van vierkant
omtrek van reghoek
oppervlakte van vierkant
oppervlakte van reghoek

1. Voltooi die tabel. Gee jou antwoorde in mm en cm.

Figuur	Watfer formule sal jy gebruik om die volgende te bereken:	
	Omtrek	Oppervlakte
	Formule:	Formule:
	$P = \text{mm} = \text{cm}$	$A = \text{mm}^2 = \text{cm}^2$
	Formule:	Formule:
	$P = \text{mm} = \text{cm}$	$A = \text{mm}^2 = \text{cm}^2$
	Formule:	Formule:
	$P = \text{mm} = \text{cm}$	$A = \text{mm}^2 = \text{cm}^2$

2. Konstrueer en bereken die oppervlakte en die omtrek van die volgende:

a. Reghoek ABCD waar $AB = 2,4 \text{ cm}$ en $BC = 1,6 \text{ cm}$.

b. Vierkant ABCD waar $AB = 3,9 \text{ cm}$.

c. Reghoek ABCD en vierkant BEFC, waar die reghoek en vierkant dieselfde sy BC deel en sy $EF = 2,7 \text{ m}$ en sy $AB = 4,1 \text{ m}$.

Probleemoplossing

As die omtrek van 'n vierkant 24 cm is, wat is die lengte van elke sy?


Die omtrek van 'n reghoekige stuk grond is $29,5 \text{ m}$. As die lengte met 2 m verhoog word en die breedte met 1 m verminder word, bly die oppervlakte van die stuk grond onveranderd. Wys of dit waar of onwaar is.

Hersien die formules:

$$A = \frac{1}{2} (b \times h)$$

Oppervlakte van 'n driehoek = $\frac{1}{2}$ (basis $\times$ loodregte hoogte)

Elke driehoek het drie basisse (of sye), elkeen met 'n verwante hoogte. Hierdie hoogte van 'n driehoek is 'n lynsegment wat vanaf enige hoekpunt, wat loodreg aan die teenoorstaande sy is, getrek word.



Let wel: AD is die loodregte hoogte op BC van $\triangle ABC$

1. Wat is die formule vir die berekening van die oppervlakte van 'n driehoek?

2. Trek die volgende driehoeke en bereken die oppervlakte deur die basis en die loodregte hoogte van elke driehoek te meet.

a. 'n Gelykbenige driehoek.

b. 'n Reghoekige driehoek.


c. 'n Ongelykbenige driehoek.

3. Wat is die oppervlakte van 'n driehoek wat 'n:

- a. Basis van 4 cm en 'n hoogte van 2,3 cm het?
 b. Basis van 2,8 cm en 'n hoogte van 3,6 cm het?
 c. Basis van 34 mm en 'n hoogte van 4,2 cm het?

4. Wat is die lengte van die basis van 'n driehoek wat 'n oppervlakte van 40 cm² en 'n hoogte van 4 cm het?

5. Bereken die oppervlakte. $AB = 3,0$ cm
 $AG = 1,5$ cm
 $AG = ED$
 $CD = 2$



Probleemoplossing

As die oppervlakte van 'n driehoek 5,635 cm² is, wat kan die hoogte dan wees?

Oppervlakte van parallelogramme en trapesiums

Hersien:


$$A = l \times w$$

$$A = \frac{1}{2} (b \times h)$$

Oppervlakte van 'n reghoek
Oppervlakte van 'n driehoek


Om die oppervlakte van 'n **parallelogram** te bepaal, kan ons 'n soortgelyke formule gebruik as vir die oppervlakte van 'n reghoek deur die lengte van die basis (lengte) met die loodregte hoogte te vermenigvuldig.

Die parallelogram kan in driehoëke verdeel word.



Om die oppervlakte te bepaal van 'n **trapesium** waarvan die lengte van die parallelle sye a eenhede en b eenhede is en die loodregte afstand daartussen h eenhede is, gebruik ons hierdie formule:

$$A = \frac{1}{2} (a+b)h$$



1. Wat is die formule vir die berekening van die:

- a. Oppervlakte van 'n parallelogram.

- b. Oppervlakte van 'n trapesium.

2. Bepaal die oppervlakte van 'n trapesium, waarvan die parallelle sye 10,5 cm en 8,2 cm en die loodregte afstand tussen die sye 4 cm is.


3. Bepaal die oppervlakte van 'n parallelogram met basis 6,4 cm en hoogte 3,8 cm.

Probleemoplossing

As die oppervlakte van die trapesium 39 cm^2 is, wat kan die hoogte dan wees?

Oppervlakte van 'n rombus


'n Rombus is 'n spesiale soort parallelogram en die oppervlakte daarvan kan met dieselfde formule ($A = b \times h$) of met hierdie formule bepaal word, waar die oppervlakte die helfte is van die produk wanneer die lengtes van die twee diagonale met mekaar vermenigvuldig word.



$$A = \frac{1}{2} xy$$

Oppervlakte van 'n vlieër

'n Vlieër het twee pare aangrensende sye wat gelyk is en een paar teenoorstaande hoeke wat gelyk is. Diagonale sny mekaar by regte hoeke. Een diagonaal word deur die ander gehalveer. Beskou die oppervlakte van die volgende vlieër.



$$A = \frac{1}{2} xy$$


1. Wat is die formule vir die berekening van die:

a. Oppervlakte van 'n rombus

b. Oppervlakte van 'n vlieër

2. Bepaal die oppervlakte van 'n rombus met diagonale wat 12,5 cm en 18,5 cm meet.

3. Bepaal die oppervlakte van hierdie vlieër.



a. Gebruik die formule.

b. Gebruik die formule vir 'n driehoek.

Probleemoplossing

As die oppervlakte van die vlieër 112 cm² is, wat kan die diagonale daarvan wees?


Hersien die formules vir alle poligone wat jy tot dusver geleer het. Is 'n sirkel 'n poligoon of nie? Hoekom?

Oppervlakte van 'n sirkel

Die oppervlakte van 'n sirkel word deur 'n formule gegee:

$$\text{Oppervlakte} = \pi r^2 \text{ waar } \pi = \frac{22}{7} \text{ en } r \text{ die radius is.}$$

Let wel! Die waarde van π is 'n desimaal wat vir ewig aangaan, maar ons beperk dit gewoonlik tot drie desimale plekke: 3,142.



1. Wat is die formule vir die berekening van die oppervlakte van 'n sirkel? Toets die formule.

2. Konstrueer, benoem en bereken die volgende sirkels met hierdie middellyne.

a. 14 cm

b. 10,4 cm

c. 78 cm

Probleemoplossing

As die oppervlakte van die sirkel 154 cm^2 is, wat is die radius dan?



